

Növényvédelmi intézkedések jégeseti károk esetén gyümölcsstermesztésben

Автор(и): Растителна защита
Дата: 06.07.2017 Брой: 7/2017



A jégeső alatt a levelek megszakadnak, a hajtások, a vesszők és az ágak megsérülnek. A kár különösen veszélyes a gyümölcsnövekedés és érés időszakában. A kár mértéke a jégeső intenzitásától és időtartamától, és természetesen az érintett növénytől függ.

A jégeső utáni első intézkedés, hogy azonnal megtisztítjuk az ágakat a jégtömegtől, és a legkorábbi alkalommal megfelelő réztartalmú gombaölő szerekkel kezeljük őket. Minden fát kezelni kell, függetlenül attól, hogy termő vagy fiatal. A jégeső által okozott sebek jelentős előfeltételei a gombás és baktériumos betegségek fertőzésének.

Célszerű, ha a jégeső által levert gyümölcsöket gyorsan összegyűjtjük és alkalmasságuk szerint hasznosítjuk, de semmilyen körülmények között nem szabad hagyni, hogy a talaj felszínén elrothadjanak. A fákon lévő sebek nagyon veszélyesek, mert ha a mélyebb rétegeket érintik, nehezen gyógyulnak. Nagyobb jégdarabok esetén kérgszakadások keletkeznek, amelyek néha nagyon kiterjedtek, és a súlyosan érintett fák elpusztulnak. Ezért jégeső után a sebeket simítani kell, a súlyosan sérült részeket el kell távolítani, és a felületeket olajalapú festékkel kell bevonni. A gyümölcsfáknak megvan a képessége a gyors felépülésre; ezért mechanikai sérülés után az enyhén sérült ágakat hagyjuk, és ha nem épülnek fel, akkor a téli metszés során kivágjuk őket.

Szükséges a növényvédelem folytatása a betegségek és kártevők ellen a gyümölcsfáknál jégeső után, hogy megelőzzük a további károkat a varasodástól, a almamolyoktól, a levéltetvektől és másoktól.