

Növényvédelmi gondoskodás júliusban a szőlőültetvényekben

Автор(и): гл.експерт Татяна Величкова, Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ

Дата: 06.07.2017 Брой: 7/2017



Ebben az időszakban a szőlőtőkék a korai fajtáknál a "virágzás befejeződése" és a "bogyóérés kezdete" fenológiai stádiumok között vannak.

A időszak fő kártevői

Szőlő lisztharmat *Plasmopara viticola*

Szőlő lisztpenész *Oidium tuckeri*

Szürke penész *Botrytis cinerea*

Baktériumos szőlőrák *Agrobacterium vitis*

Szőlőmoly *Lobesia botrana*

Szőlőlepke *Theresimima ampelophaga*

Szőlőpajzstetű *Pulvinaria vitis*

Sárga szőlőatka *Schizotetranychus viticola*

Baktériumos szőlőrák

A fertőzött növényeken a talajszint közelében vagy közvetlenül az alatt, a megfásodott részeken duzzanatokat (daganatokat) figyelhetünk meg. A beteg növények visszamaradott növekedést, klorotikus leveleket mutatnak, és hideg teleken könnyen kifagynak.

Kártevőirtási stratégia:

Júliusban a betegség tüneteit mutató tőkét meg kell jelölni.

Szőlőpajzstetű

A lárvakelés július első felében folytatódik. Kártételüket a levelek, hajtások és fűtők nedveit szívva okozzák. Egyszer vedlenek, egy ideig táplálkoznak, majd elhagyják a táplálkozó helyeket és áttelelő helyeikre vándorolnak. A károsítás következtében a szőlőtőkék legyengülnek.

Kártevőirtási stratégia:

A fiatal lárvák ellen végeznek vegyszeres védekezést.

Engedélyezett növényvédő szer:

movento 100 sc - 0,075-0,095%;

