

Heti agrometeorológiai előrejelzés július végére és augusztus elejére

Автор(и): Растителна защита
Дата: 29.07.2017 Брой: 7/2017



Július végéig és augusztus első napjaiban a mezőgazdasági növények fejlődése a klímai normákhoz közeli hőmérsékletek mellett fog zajlani, és az ország számos részén – javult talajnedvesség-tartalékok mellett.

Az elmúlt időszak utolsó napjaiban lezajlott zivatarok, jégesők és záporok (Ruse - 45 l/m², Szilisztra - 43 l/m² és Sumen - 33 l/m²) után a következő időszakban az időjárás stabilizálódása és az agrometeorológiai viszonyok változása várható. Az Észak-Bulgária számos helyén (Vraca, Polski Trambes, Trojan, Ruse, Carev Brod) hullott jégeső ismét nem kímélte a mezőgazdasági növényeket. Károk keletkeztek a még be nem aratott búzaállomány egy részén (a növények kidőltek, a kalászkok szétszakadtak), valamint a tavaszi növényekben, a zöldségfélékben és a gyümölcsfákban.

A következő időszak elején, az első lehetőségre, a jégeső által károsított zöldségféléket, gyümölcsfákat és szőlőt célszerű réztartalmú gombaölő szerekkel kezelni a sebgyógyulás felgyorsítása és a kórokozók általi másodlagos fertőzések csökkentése érdekében (szürkepenész a szőlőben, késői barna rothadás a gyümölcsfák termésén, burgonyavész és Alternária a paradicsomon).

Július végéig és augusztus első napjaiban a mezőgazdasági növények fejlődése a klímai normákhoz közeli hőmérsékletek mellett fog zajlani, és az ország számos részén – javult talajnedvesség-tartalékok mellett. Az időszak alatt a korai hibrid kukoricákban a tejérlelési fázis figyelhető meg, valamint átmenet a tejérlelésből a viaszérlelésbe a Duna-menti síkság és az ország déli régióinak egyes területein. A napraforgónál a magtöltés zajlik majd. Augusztus elején Dél-Bulgária egyes állományai belépnek az érési fázis kezdetébe.

Az időszak alatt a felső talajrétegek megnövekedett nedvességtartalma egyes helyeken késlelteti a búzaarás befejezését.

Forrás: NIMH-BAN