

Késői barna rothadás /*Monilia fructigena*/

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.07.2017 Брой: 7/2017



A nyári hónapokban a kórokozó támadásának gyakorisága csökken. A betegség fejlődésének kedvező feltételei mellett (megnövekedett páratartalom és mérsékelten magas hőmérséklet) barna foltok jelennek meg a gyümölcsökön, amelyek kitágulnak és elfedhetik a teljes gyümölcsöt. A károsított szövetek barnák, rothadtak, koncentrikus gyűrűkkel, melyeket sárgásfehér vagy hamuszürke spóratermő kötegek borítanak. Alacsony páratartalom mellett a teljes gyümölcs összezsugorodik és mumifikálódik.

Kártevőirtási stratégia

A kezelést kedvező feltételek és a betegség első tüneteinek megjelenése esetén végezzük.

Engedélyezett növényvédő szerek:

Difcor 250 SC - 20 ml/da, Captan 80 WG - 150-180 g/da, Luna Experience - 63-75 ml/da, Prolectus 50 WG - 80-120 g/da, Signum - 60-75 g/da, Systhane 20 EW - 12.5-30.0 ml/da, Systhane Ekosom EW - 65–200 ml/da, Chorus 50 WG - 0.045%.