

Previsioni agrometeorologiche per marzo 2019

Автор(и): Растителна защита
Дата: 18.03.2019 Брой: 3/2019



All'inizio di marzo, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da un clima caldo per la stagione. Durante la prima decade, nella maggior parte delle regioni coltivabili del paese, i valori previsti delle temperature medie giornaliere supereranno il minimo biologico necessario per la ripresa dei processi vegetativi nelle colture cerealicole invernali e nella colza.

All'inizio della seconda decade, è previsto un calo delle temperature, più significativo nel nord della Bulgaria e negli altopiani, che limiterà e ritarderà lo sviluppo delle colture agricole. In questo periodo, condizioni per una lenta vegetazione nelle colture cerealicole invernali si creeranno principalmente nelle regioni estreme sud-orientali e meridionali del paese.

Alla fine della seconda e all'inizio della terza decade di marzo, è previsto un miglioramento delle condizioni termiche e un'attivazione dei processi vegetativi nelle colture autunno-vernine e nelle piantagioni perenni. Entro la fine di marzo, la maggior parte delle coltivazioni di frumento e orzo a sviluppo tardivo che hanno svernato allo stadio di 2-3 foglie entreranno nella fase di accestimento. Nelle colture cerealicole invernali che hanno accestito in autunno, si osserverà un aumento del coefficiente di accestimento. Alla fine di marzo, la colza che ha svernato allo stadio di rosetta formerà le branche.

A marzo, nelle colture frutticole avranno luogo le fasi di rigonfiamento e schiusura delle gemme.

Alla fine del mese, nelle specie a fioritura precoce (mandorlo, albicocco, pesco) si osserverà lo stadio del bottone florale e, in alcune località, principalmente nelle regioni meridionali, anche l'inizio della fioritura. Durante il mese, le temperature minime previste, fino a -8°C, rappresenteranno un rischio per gli alberi da frutto più avanzati che sono entrati nelle fasi di formazione delle gemme e fioritura. Le precipitazioni previste a marzo, intorno alla norma, aumenteranno le riserve di umidità del suolo negli strati di un metro e più profondi. Alla fine di febbraio, nella maggior parte delle regioni coltivabili, le riserve di umidità del suolo per le colture cerealicole invernali nello strato di un metro erano superiori al 90% della capacità di campo (CC). Eccezioni sono state osservate in alcune località della Pianura Danubiana (stazione agrometeorologica di Novachene), nelle regioni estreme meridionali (Haskovo) e orientali (D. Chiflik), dove il livello delle riserve di umidità era inferiore – 85-86% della CC. Durante il mese, condizioni più favorevoli per eseguire la lavorazione pre-semina delle aree destinate alla semina con colture primaverili precoci e medio-precoci, e per effettuare i trattamenti fitosanitari nei frutteti, si verificheranno all'inizio del mese, nella seconda metà della seconda decade, e a metà della terza decade. A metà marzo inizia la finestra agrotecnica (15-20.03) per la semina del girasole nel sud della Bulgaria, e a metà della terza decade (25.03-5.04) – nella Pianura Danubiana.

Fonte: NIMH