

Condizioni adatte per eseguire le operazioni di lavorazione pre-semina e la semina del girasole saranno presenti alla fine di marzo

Автор(и): Растителна защита

Дата: 24.03.2019 Брой: 3/2019



Nel prossimo periodo, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da temperature superiori alle norme climatiche per la terza decade di marzo.

Insolitamente per l'inizio della primavera, lo sviluppo delle colture invernali in parte delle regioni campione del paese avverrà con riserve idriche del suolo insoddisfacenti nello strato di 50 cm – una conseguenza delle precipitazioni inferiori alla norma alla fine dell'inverno, delle temperature di marzo superiori alla norma e della continua vegetazione attiva delle colture. Alla fine della seconda decade di marzo, le riserve idriche più basse

nello strato di 50 cm, misurate nel frumento, sono state registrate localmente nelle regioni meridionali e sudorientali del paese, al di sotto del 65% della capacità di campo. Le migliori riserve idriche, superiori all'85-90% della capacità di campo, sono segnalate per le colture invernali nelle parti nordoccidentali della Pianura Danubiana.

Verso la fine del periodo, è atteso un calo delle temperature e un cambiamento delle condizioni agrometeorologiche. I valori previsti delle temperature minime, localmente fino a -2°C, pongono un rischio per le fioriture e l'allegagione delle specie drupacee che sono in fase avanzata del loro sviluppo, specialmente se le basse temperature persistono per un tempo più prolungato.

Sono attese ulteriori precipitazioni e le condizioni per la germinazione delle colture primaverili seminate miglioreranno.

Nel frumento, si osserverà su larga scala la fase di accestimento, e in alcune località delle regioni nordorientali (Tsarev Brod, Dolni Chiflik) – l'inizio della levata. Nella colza, sarà in corso la formazione delle ramificazioni.

Durante la maggior parte dei giorni del periodo, le condizioni saranno adatte per eseguire le lavorazioni pre-semina e la semina del girasole. Durante il periodo, scade il termine ottimale per la semina del girasole nella Bulgaria meridionale. A metà della terza decade di marzo, inizia la finestra agrotecnica per la semina del girasole nella Pianura Danubiana (25.03–05.04).

Fonte: NIMH