

Il clima umido durante la prima metà di maggio è una condizione preliminare per lo sviluppo di patogeni fungini.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 07.05.2019 Брой: 5/2019



Il tempo umido creerà le condizioni per l'insorgenza e lo sviluppo di patogeni fungini, la cui prevenzione richiede l'applicazione di fungicidi sistemici.

Nel periodo dal 3 al 9 maggio sono previste condizioni agrometeorologiche dinamiche e variabili. I processi vegetativi nelle colture agricole procederanno con temperature medie inferiori alle norme climatiche e con frequenti precipitazioni, secondo le previsioni sinottiche.

Nella prima metà del periodo sono attese precipitazioni, in molti luoghi delle aree pianeggianti del paese anche intense, che manterranno le riserve di umidità del suolo migliorate dopo il superamento della precoce siccità primaverile. Il vento previsto limiterà ulteriormente le possibilità di svolgere attività di protezione delle piante nelle colture cerealicole invernali, nel colza e nei frutteti permanenti.

Durante il periodo, il frumento si troverà nelle fasi di allungamento del fusto, transizione dall'allungamento del fusto alla spigatura e spigatura. Nel colza si osserveranno la fioritura, la formazione e la crescita dei baccelli. Nelle colture primaverili seminate avverrà la formazione delle foglie.

Il tempo umido creerà le condizioni per l'insorgenza e lo sviluppo di patogeni fungini, la cui prevenzione richiede l'applicazione di fungicidi sistemici.

Alla fine del periodo è previsto un miglioramento delle condizioni agrometeorologiche (un iniziale aumento delle temperature, indebolimento del vento, bassa probabilità di precipitazioni) e la creazione di opportunità più favorevoli per lo svolgimento delle attività agrotecniche.

Fonte: NIMH