

Previsioni agrometeorologiche per il mese di maggio

Автор(и): Растителна защита
Дата: 10.05.2019 *Брой:* 5/2019



All'inizio di maggio, lo sviluppo delle colture agricole procederà con temperature inferiori alla norma e con buone riserve di umidità del suolo, risultato delle precipitazioni superiori alla norma di aprile. Le precipitazioni di aprile (Pleven - 116l/m², Veliko Tarnovo - 63l/m², Lovech – 125l/m², Razgrad - 64l/m², Dobrich - 60l/m², Sofia - 78l/m², Sandanski - 58l/m², Pazardzhik - 60l/m², Plovdiv - 58l/m², Haskovo - 89l/m², Kardzhali - 75l/m², Elhovo - 79l/m², Stara Zagora - 55l/m², Karnobat - 52l/m²), successive alla siccità di inizio primavera, sono state decisive per superare il deficit di umidità del suolo nelle colture seminate in autunno. Le precipitazioni previste durante la prima decade di maggio manterranno un livello molto buono delle riserve di umidità negli strati di suolo di 50cm e 100cm, superiore all'85% della capacità di campo (CC). Queste precipitazioni avranno un effetto benefico

sulle colture cerealicole invernali e sulla colza, che si trovano nella fase riproduttiva del loro sviluppo, con maggiori esigenze di umidità del suolo. In questo periodo, nel frumento e nell'orzo nelle regioni di campo del paese, si verificheranno la fase di allungamento del fusto, la transizione dall'allungamento del fusto alla spigatura e la fase di spigatura. Nella colza avverranno la fioritura, la fecondazione e la formazione dei baccelli.

Alla fine della prima decade, sono previste gelate al suolo negli appezzamenti più elevati, da tenere in considerazione durante il trapianto delle piantine di ortaggi e tabacco. Un sostanziale miglioramento delle condizioni termiche e un'accelerazione dei processi vegetativi nelle colture agricole sono attesi nella prima metà della seconda decade.

Nella seconda metà di maggio, le condizioni agrometeorologiche rimarranno instabili, con frequenti precipitazioni. Lo sviluppo delle colture agricole procederà a temperature intorno e sopra le norme climatiche. In questo periodo, la formazione e il riempimento della granella nelle colture cerealicole invernali avverranno con riserve di umidità del suolo molto buone e ottimali. Alla fine della terza decade, nel frumento e nell'orzo delle regioni meridionali e in alcune zone della Pianura Danubiana, si osserverà l'inizio della fase di maturazione lattea. Durante il mese, si verificherà la formazione fogliare nel mais e nel girasole. Alla fine di maggio, nel girasole seminato nei tempi agrotecnici, si osserverà la formazione dell'infiorescenza. Le frequenti precipitazioni di maggio creeranno le condizioni per un aumento del potenziale infettivo di numerose malattie fungine: nel frumento le ruggini (bruna, gialla) e la fusariosi della spiga; le peronosspore nelle colture orticole e nella vite; la moniliosi precoce e la corineo nelle drupacee, la ticchiolatura nelle pomacee, ecc. Durante il mese, condizioni più adatte per effettuare i trattamenti fitosanitari si presenteranno a metà della prima, nella prima metà della seconda e nella terza decade.

A maggio è prevista una maggiore probabilità di grandine. In caso di danni parziali da grandine, è consigliabile che le colture colpite vengano trattate alla prima occasione con fungicidi a base di rame per una più rapida cicatrizzazione delle ferite e una riduzione del rischio di infezioni secondarie.

Fonte: NIMH