

Previsioni agrometeorologiche per il mese di giugno

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.06.2019 *Брой:* 6/2019



Nella maggior parte dei giorni di giugno, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da tempo instabile con precipitazioni distribuite in modo irregolare, il che comporterà anche differenze sostanziali nei livelli di riserva di umidità del suolo. Nella Bulgaria occidentale, dove si prevede che le precipitazioni di giugno, analogamente a quelle di maggio, raggiungano e superino le norme mensili, sono previste riserve di umidità del suolo molto buone. Per le colture primaverili, nello strato di 50 e 100 cm rimarranno superiori all'80% della capacità di campo (CC). Livelli inferiori di riserve di umidità del suolo sono attesi nelle regioni orientali, dove sono previste anche minori precipitazioni a giugno.

Durante il primo e il secondo periodo di dieci giorni, lo sviluppo delle colture agricole procederà a un ritmo moderato, con temperature vicine alle norme climatiche. All'inizio di giugno, nei campi più alti, nelle colture cerealicole invernali avverrà la fase di riempimento della granella. Nel frumento delle aree di pianura, si osserverà lo stadio di maturazione lattea, mentre nell'orzo – maturazione lattea e transizione alla maturazione cerosa. Nel frumento, durante il periodo inter-fase di riempimento della granella – maturazione lattea, le larve della cimice dei cereali (*Eurygaster integriceps*) causano gravi danni. Durante questo periodo, le colture di frumento devono essere ispezionate per la presenza del parassita e, a densità superiori alla soglia di danno economico (2 larve/m²), il trattamento insetticida è imperativo.

Alla fine del primo e all'inizio del secondo periodo di dieci giorni, l'orzo sarà prevalentemente in maturazione cerosa, e la colza sarà nella fase di maturazione.

Durante il terzo periodo di dieci giorni, lo sviluppo delle colture agricole procederà a un ritmo accelerato, in condizioni termiche superiori alla norma. Nella prima metà di questo periodo di dieci giorni, il frumento nelle aree di pianura raggiungerà la maturazione cerosa e piena. Entro la fine di giugno, alcune delle colture primaverili entreranno in fasi di sviluppo riproduttivo – nel girasole, inizierà la fioritura, e negli ibridi di mais precoci – emissione della pannocchia e fioritura della spiga maschile.

Durante il mese, le temperature massime previste, in alcuni luoghi fino a 35°C, avranno un impatto negativo sulla fioritura e la fecondazione nelle colture orticole. Le condizioni meteorologiche di giugno manterranno un elevato fondo infettivo di patogeni fungini: marciume bruno tardivo nelle cultivar tardive di ciliegio, ticchiolatura e oidio negli alberi da frutto, peronosporae nei vigneti e nelle colture orticole. Nella vite, il periodo inter-fase dalla fioritura delle infiorescenze alla formazione di acini delle dimensioni di un pisello è critico per l'infezione da peronospora. Durante il primo periodo di dieci giorni di giugno, è prevista una maggiore probabilità di grandine, con rischio di allettamento delle colture e danni aggiuntivi alle colture agricole. Dopo una grandinata, le colture frutticole e orticole colpite devono essere trattate con fungicidi a base di rame alla prima opportunità.

Durante il mese, condizioni più adatte per eseguire lavorazioni del suolo in vegetazione per le colture primaverili si verificheranno nel terzo periodo di dieci giorni.