

15 marzo 2024

Condizioni meteorologiche instabili e temperature superiori alla norma

Le condizioni meteorologiche instabili e le temperature superiori alla norma stanno influenzando la stagione di semina primaverile in tutta Europa.

Gli agricoltori in Italia, Francia e Germania segnalano ritardi nella semina di colture come mais, girasoli e barbabietole da zucchero a causa di terreni eccessivamente umidi.

"Non possiamo entrare nei campi con le nostre macchine", ha detto un agricoltore della Pianura Padana. "Il terreno è troppo bagnato e rischiamo di compattarlo, il che danneggerebbe la struttura del suolo per tutta la stagione."

I meteorologi prevedono che questo modello di precipitazioni intense seguite da periodi insolitamente caldi continuerà per gran parte di aprile.

- Ritardi nella semina fino al 30% in alcune regioni
- Preoccupazioni per la riduzione dei raccolti se la semina non viene completata entro maggio
- Aumento del rischio di malattie fungine a causa delle condizioni umide

"Questa non è solo una brutta stagione; è un segno di come il cambiamento climatico stia alterando i modelli agricoli fondamentali", ha affermato un agronomo dell'Università di Bologna.

Le associazioni agricole chiedono sostegno finanziario per le aziende colpite e maggiori investimenti in ricerca per colture più resilienti.

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 26.06.2019 Брой: 6/2019*



Nella maggior parte dei giorni del periodo di sette giorni (21–27.06.2019) le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da tempo instabile e temperature superiori alla norma. All'inizio dell'estate, le temperature massime estremamente elevate previste, in alcuni luoghi fino a 37–38°C, ostacoleranno la vegetazione delle colture primaverili. Questi valori avranno un impatto negativo sulla formazione degli organi riproduttivi di alcune colture orticole (fagiolini, pomodori, peperoni, cetrioli, ecc.), e in condizioni di bassa umidità atmosferica potrebbero causare la caduta di fiori e allegagione. Un calo delle temperature e un miglioramento delle condizioni per lo sviluppo delle colture agricole è previsto per la metà del periodo.

Durante il periodo, nel frumento delle aree di pianura, si osserveranno la fase della pasta molle di massa e la piena maturazione, mentre nei campi più alti – la maturazione lattea e il passaggio alla pasta molle. Nel girasole avverrà la formazione dell'infiorescenza, e in alcuni luoghi della Pianura Danubiana (le stazioni agrometeorologiche di Băzovec, Pavlikeni) si osserverà anche l'inizio della fioritura nelle colture. Nel mais, avverrà la formazione delle foglie. Alla fine del periodo, negli ibridi precoci, si osserverà l'inizio dell'emissione della pannocchia. Fino all'emissione della pannocchia, le colture di mais devono essere ispezionate per la presenza di uno dei parassiti economicamente più importanti – la piralide del mais. Quando la densità del

parassita supera la soglia di danno economico (10 ovature per 100 piante), è necessario un tempestivo trattamento insetticida (contro le giovani larve prima che penetrino nei fusti).

Le precipitazioni durante il periodo in molte parti del paese, ad eccezione delle regioni sudorientali e della costa del Mar Nero, ostacoleranno temporaneamente la raccolta dell'orzo e del frumento. È nuovamente prevista una maggiore probabilità di grandine, con rischio di allettamento delle colture e sfaldamento della granella. Dopo la grandine, si raccomanda di trattare le colture orticole e i vigneti colpiti con fungicidi a base di rame alla prima opportunità.

Fonte: NIMH