

Aumento del background infettivo da patogeni fungini nelle colture ortofrutticole

Автор(и): Растителна защита
Дата: 18.07.2019 Брой: 7/2019



Nel corso del periodo di sette giorni (19 – 25 luglio) lo sviluppo delle colture agricole procederà a ritmo accelerato, a causa delle temperature superiori alla norma e, in parte delle regioni meridionali, grazie alle buone riserve di umidità presenti negli strati del suolo a 50 e 100 cm. Le precipitazioni della seconda decade di luglio hanno superato localmente nel Sud della Bulgaria i 30-40 l/m² (Blagoevgrad - 41 l/m², Plovdiv - 34 l/m², Sliven - 56 l/m², Burgas - 40 l/m², Kardzhali - 41 l/m² e Chirpan - 33 l/m²). Queste piogge hanno avuto un effetto benefico sulle colture primaverili, che si trovano in fasi di crescita riproduttiva con maggiore fabbisogno idrico.

Nel periodo in esame, il girasole sarà nella fase di riempimento della granella. Nel mais si osserveranno diverse fasi – dalla fioritura ed emissione delle pannocchie negli ibridi tardivi, alla fase di maturazione lattea negli ibridi

precoci di mais nelle aree di coltivazione del paese. Nella terza decade di luglio, le fave saranno in fase di maturazione, mentre il cotone entrerà nell'inizio della fioritura.

Nel prossimo periodo, nella maggior parte del paese, ad eccezione di alcune località delle regioni orientali, è previsto un tempo relativamente secco, che fornirà condizioni adatte per lo svolgimento delle attività agrotecniche stagionali, la più importante delle quali è il completamento della raccolta del frumento.

Attualmente, le rese di frumento ottenute presso le stazioni agrometeorologiche del NIMH variano tra i 420 kg/daa delle stazioni di Dolni Chiflik e Karnobat e i 650 kg/daa della stazione di Glavinitsa.

Durante il periodo, i trattamenti fitosanitari dovrebbero essere effettuati durante le ore più fresche della giornata con prodotti fitosanitari aventi un appropriato intervallo pre-raccolta, in linea con il periodo di maturazione delle colture. Le frequenti precipitazioni della prima metà di luglio hanno aumentato il potenziale infettivo di alcuni patogeni fungini: peronospora sulle colture orticole, marciume bruno tardivo sulle varietà precoci di frutta (pesche, nettarine, prugne e pere). Nella terza decade di luglio, nelle colture frutticole, non si deve sottovalutare il controllo della seconda generazione della carpocapsa. Nei vigneti, i trattamenti contro l'oidio possono essere combinati con quelli contro gli acari e le larve della seconda generazione della tignoletta della vite.

Fonte: NIMH