

Previsioni agrometeorologiche per agosto

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.08.2019 Брой: 8/2019



Nella maggior parte dei giorni della prima decade di agosto, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da tempo instabile e temperature attorno e leggermente al di sotto della norma per il periodo. Le previste condizioni meteorologiche all'inizio del mese aumenteranno il livello di infezioni da alcuni patogeni fungini: peronospora sulle colture orticole da produzione tardiva in campo, marciume bruno tardivo nei frutteti e muffa grigia sulle varietà precoci di uva in maturazione.

Le precipitazioni di fine luglio, che in alcune zone delle regioni nord-occidentali e centrali hanno superato i 30-40 l/m² (N. Selo, Vidin, Vratsa, Montana, Lovech, V. Tarnovo), e le precipitazioni attese durante la prima decade di agosto, avranno un effetto benefico sulle seconde colture e sugli ibridi di mais più tardivi, in cui avverrà la formazione e il riempimento della granella. Durante la decade, gli ibridi di mais medio-precoci saranno nello

stadio di maturazione lattea, mentre quelli precoci raggiungeranno la maturazione cerosa e piena (stazioni agrometeorologiche Bazovets, Kneja, Glavinitsa, Pazardzhik, Plovdiv). Nel girasole, nella Pianura Danubiana e nelle regioni meridionali, si verificherà lo stadio di maturazione.

Alla fine della prima decade, è previsto un sostanziale aumento delle temperature e una progressione accelerata delle fasi finali di sviluppo delle colture tardive in campo. Durante la seconda e terza decade, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da un tempo relativamente secco e temperature attorno e al di sopra delle norme climatiche.

Nella seconda metà di agosto, gran parte delle colture tardive in campo completerà il suo sviluppo. Nel girasole si osserverà la maturazione tecnica di massa, e nella soia – lo stadio di maturazione. Alla fine del mese, prevarrà la maturazione cerosa negli ibridi di mais medio-tardivi. Nel riso si verificherà lo stadio di maturazione lattea, e nel cotone – l'apertura delle capsule.

Nella seconda metà del mese, il deficit di umidità del suolo nelle seconde colture si approfondirà e renderà necessari aumenti delle dosi di irrigazione. In molte località delle regioni di pianura, la mancanza di umidità negli strati superficiali del suolo ostacolerà l'esecuzione qualitativa dell'aratura profonda e della lavorazione pre-semina delle aree destinate alla semina della colza invernale. I periodi agrotecnici di semina per la colza iniziano nella terza decade di agosto.

In agosto, per le varietà tardive di alberi da frutto, non si deve sottovalutare l'attività dannosa dell'ultima generazione di tignole. Il tempo relativamente secco durante la maggior parte dei giorni del mese sarà un presupposto per un aumento delle popolazioni di acari. Nei vigneti, è necessario monitorare la comparsa e la densità delle larve di terza generazione della tignoletta della vite. I trattamenti fitosanitari dovrebbero essere effettuati durante le ore più fresche della giornata con prodotti che abbiano un appropriato intervallo pre-raccolta, in base al periodo di maturazione delle colture.

Fonte: NIMH