

# Previsioni agrometeorologiche per settembre

*Автор(и):* Растителна защита  
*Дата:* 16.09.2019 *Брой:* 9/2019



All'inizio di settembre, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da un tempo secco, caldo e, in molte zone delle pianure, caldo, il che accelererà il progresso delle fasi finali di sviluppo delle colture tardive in campo. Durante la prima settimana del mese, gli ibridi di mais medio-tardivi raggiungeranno la maturazione cerosa e piena, mentre gli ibridi tardivi saranno nella fase lattea e nella transizione verso la maturazione cerosa.

Nella maggior parte dei giorni della prima decade, le condizioni rimarranno adatte per effettuare la raccolta del girasole e per liberare le aree seminate con ibridi di mais più precoci. Alla fine della decade, è prevista una diminuzione delle temperature e un cambiamento delle condizioni agrometeorologiche. Le precipitazioni previste, dopo la siccità intensificatasi alla fine dell'estate, miglioreranno le condizioni degli strati superficiali del suolo, il che è un prerequisito per una lavorazione pre-semina e una semina della colza invernale di qualità

superiore. I periodi agrotecnici ottimali per la semina della colza sono fino alla fine della seconda decade di settembre.

Durante la seconda e la terza decade, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da temperature vicine alle norme climatiche. Entro la metà di settembre, gli ibridi di mais tardivi completeranno il loro sviluppo; il riso sarà in maturazione cerosa e piena, e la barbabietola da zucchero raggiungerà la maturazione tecnica. Nella terza decade, prima delle date consuete, le varietà tardive di uva da vino raggiungeranno la maturazione tecnologica. Il cotone sarà nella fase di maturazione.

Le precipitazioni previste durante la seconda metà della seconda e l'inizio della terza decade saranno di grande importanza per la normale emergenza della colza. Nelle regioni dove l'umidità non è un fattore limitante, nelle colture seminate entro il periodo agrotecnico, la fase di emergenza sarà osservata alla fine di settembre. Nella fase di emergenza, gravi danni alla colza sono causati dalla pulce del fusto del cavolo (individui adulti) e dalla tentredine della colza (false larve), il che richiede un monitoraggio durante questa fase per determinare la presenza e la densità di popolazione dei parassiti. Quando la densità supera la soglia di danno economico (SDE per la pulce del fusto del cavolo - 2 coleotteri per m<sup>2</sup>; SDE per la tentredine della colza 2-3 false larve per m<sup>2</sup>), il trattamento è obbligatorio.

A settembre, per le colture orticole da produzione tardiva in campo, non devono essere sottovalutati i trattamenti di protezione delle piante contro i bruchi della terza generazione di eliotide, poiché causano danni e deteriorano la qualità del raccolto orticolo.

Durante la terza decade del mese, nei campi più elevati non si può escludere la possibilità di formazione di gelate, che dovrebbe essere presa in considerazione durante la raccolta delle colture orticole sensibili al gelo (pomodori, peperoni).

*Fonte: NIMH*