

Previsioni agrometeorologiche per ottobre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 11.10.2019 *Брой:* 10/2019



In ottobre, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da temperature intorno e sopra le norme climatiche e da precipitazioni vicine alle medie mensili.

All'inizio di ottobre, le temperature previste superiori alla norma, con valori massimi fino a 29-30°C, accelereranno la maturazione delle varietà tardive di alberi da frutto e dell'uva e costituiranno un presupposto per la formazione di una resa aggiuntiva dalle colture orticole tardive.

Dopo il clima insolitamente caldo della seconda metà della prima decade, è prevista una normalizzazione delle condizioni termiche. Le precipitazioni di fine settembre e le piogge attese nella prima decade di ottobre forniranno l'umidità necessaria per l'emergenza delle colture seminate all'inizio dell'autunno. La siccità di fine

estate in molte parti del paese ha ritardato la lavorazione del terreno pre-semina delle aree destinate alle semine autunnali. Per questo motivo, in gran parte delle regioni di campo sono stati superati i termini agrotecnici di semina della colza invernale. Ottobre è il periodo ottimale per la semina delle colture cerealicole invernali. Durante la prima decade ricade il periodo agrotecnico per la semina del grano nel Nord della Bulgaria, dal 15 al 25 ottobre nel Sud della Bulgaria, e alla fine del mese – lungo la costa del Mar Nero.

Durante la maggior parte dei giorni della seconda e terza decade, lo sviluppo delle colture seminate di colza e cereali invernali procederà a un ritmo moderato, in condizioni termiche vicine alla norma. Le precipitazioni previste nella seconda metà di ottobre dovrebbero migliorare il livello delle riserve di umidità del suolo nello strato di 50 cm e le condizioni per il corso delle fasi iniziali della vegetazione delle colture autunnali. Alla fine del mese, nel grano, a seconda delle date di semina, si osserveranno le seguenti fasi: emergenza, terza foglia e inizio dell'accestimento, principalmente nelle colture seminate all'inizio di ottobre. Nella colza, sarà in corso la formazione delle foglie. Alla fine di ottobre, nelle colture di colza seminate più precocemente, a settembre, si osserverà l'inizio della fase di formazione della rosetta.

In ottobre, le colture autunnali sono attaccate da numerosi parassiti. Nelle colture cerealicole invernali, è necessario monitorare l'attività dannosa dell'arvicola comune, della cetonide del grano e delle mosche dei cereali, e quando la densità dei parassiti supera la soglia di danno economico (SDE), si dovrebbe effettuare un trattamento tempestivo. Per l'arvicola comune, la SDE è di 2 colonie attive per decaro; per la cetonide del grano – 3 larve/mq.

Nella colza, durante il mese devono essere effettuati rilevamenti per la presenza dell'altica della colza (adulti) e della tentredine della rapa (false larve), e quando il loro numero supera la SDE, si deve eseguire un trattamento insetticida.

Fonte: NIMH