

Previsioni agrometeorologiche per dicembre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.12.2019 Брой: 12/2019



Le temperature sopra la norma e le riserve di umidità del suolo migliorate durante la seconda metà di novembre hanno prolungato la vegetazione autunnale di frumento, orzo e colza. Nel corso della prima decade di dicembre le condizioni agrometeorologiche saranno altamente dinamiche. Il raffreddamento previsto intorno alla metà del periodo porterà a un rallentamento e, in parti della Bulgaria settentrionale e delle regioni occidentali, dove sono attese precipitazioni inclusa la neve – a una cessazione dei processi vegetativi nelle colture cerealicole invernali e nella colza. Alla fine della prima decade è previsto un aumento delle temperature, ma i loro valori medi giornalieri rimarranno al di sotto del minimo biologico richiesto per la vegetazione delle colture seminate in autunno.

Durante la maggior parte dei giorni della seconda e terza decade, le temperature previste, intorno e sopra le norme climatiche, manterranno le colture cerealicole invernali in relativa dormienza nella maggior parte del paese. Sono possibili eccezioni per il frumento e l'orzo nelle regioni più meridionali e lungo la costa del Mar Nero. Durante i periodi relativamente più caldi nella seconda metà del mese in queste aree esiste la probabilità che si creino le condizioni per una ripresa a breve termine dei processi vegetativi nelle colture seminate in autunno, ma non è previsto alcun cambiamento negli stadi fenologici delle colture.

A causa della prolungata siccità autunnale, le colture entreranno nell'inverno in stadi diversi. Nella maggior parte del paese, ad eccezione di alcune località nella Bulgaria sudorientale, il deficit idrico del suolo ha ritardato la vegetazione di frumento, orzo e colza invernale. Alla fine dell'autunno, lo stadio di crescita prevalente delle colture cerealicole invernali è la terza foglia. Parte delle coltivazioni di frumento, principalmente nelle regioni nordoccidentali (stazioni agrometeorologiche Băzovec, Pavlikeni), sono nello stadio di emergenza e sviluppo fogliare precoce (1–2 foglie). Il frumento nelle regioni orientali del paese è nello stadio di accestimento, in cui i cereali invernali svernano con successo. Nella colza, come conseguenza del deficit di umidità durante la vegetazione autunnale, solo parte delle coltivazioni sono nello stadio di rosetta – lo stadio appropriato per lo svernamento.

A dicembre, le temperature minime previste fino a meno 11°C, in condizioni senza copertura nevosa e con persistenza più prolungata, saranno critiche per le colture cerealicole invernali nello stadio di emergenza e sviluppo fogliare precoce, e per le coltivazioni di colza che non sono riuscite a formare una rosetta.

In seguito alle significative precipitazioni durante la terza decade di novembre, che hanno superato i 50–60 mm in molti luoghi della Bulgaria meridionale (Sandanski, Pazardzhik, Plovdiv, Haskovo, Kardzhali, Chirpan), si è verificato un sostanziale aumento delle riserve di umidità negli strati superiori del suolo e, nella maggior parte delle regioni arabili del paese, il deficit di umidità nelle colture seminate in autunno è stato superato. Le precipitazioni previste a dicembre, intorno alla norma mensile, aumenteranno ulteriormente le riserve di umidità del suolo nello strato di 100 cm.