

Accogliamo gennaio con temperature minime molto basse

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.01.2020 Брой: 1/2020



Le temperature minime previste durante il mese, fino a -15°C, in condizioni di assenza di copertura nevosa e con una persistenza più prolungata, saranno critiche per le colture cerealicole invernali che non sono riuscite a entrare nella fase di accestimento durante la loro vegetazione autunnale. Questi valori saranno critici anche per le colture di colza invernale sottosviluppate che, a causa della siccità autunnale, non hanno formato una rosetta (di 7-8 foglie) – lo stadio in cui le piante svernano con successo.

Le alte temperature di dicembre hanno prolungato la vegetazione delle colture seminate in autunno. Come risultato delle temperature sopra la norma, alcune delle colture cerealicole invernali emerse tardivamente nella

Bulgaria occidentale, presso le stazioni agrometeorologiche di Kneja, Sofia, Kyustendil, hanno formato 2-3 foglie.

A gennaio, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da temperature attorno e sopra le norme climatiche, che manterranno le colture seminate in autunno e le piantagioni perenni in dormienza. Le colture cerealicole invernali affronteranno il mese più freddo dell'anno in diversi stadi fenologici – una conseguenza della prolungata siccità autunnale e della semina ritardata. Una parte significativa delle colture svernerà allo stadio di tre foglie. Nella fase di accestimento, lo stadio appropriato per lo svernamento, si trova gran parte delle colture di frumento nella Bulgaria orientale, a Silistra, Glavinitsa, Tsarev Brod, Dolni Chiflik, Yambol, Karnobat. Indebolite, nelle fasi di emergenza e formazione fogliare iniziale, sono alcune delle colture cerealicole invernali seminate tardivamente (a novembre) in alcune località della Pianura Danubiana, presso le stazioni agrometeorologiche di Nikolaevo, Pavlikeni.

Le temperature minime previste durante il mese, fino a -15°C , in condizioni di assenza di copertura nevosa e con una persistenza più prolungata, saranno critiche per le colture cerealicole invernali che non sono riuscite a entrare nella fase di accestimento durante la loro vegetazione autunnale. Questi valori saranno critici anche per le colture di colza invernale sottosviluppate che, a causa della siccità autunnale, non hanno formato una rosetta (di 7-8 foglie) – lo stadio in cui le piante svernano con successo.

Le precipitazioni previste a gennaio, attorno e al di sotto della norma, aumenteranno le riserve di umidità del suolo negli strati di 50 cm e 100 cm. All'inizio dell'inverno, nella maggior parte del paese, il livello delle riserve di umidità nello strato di suolo di un metro è insolitamente basso per la stagione. In alcune località della Bulgaria occidentale, presso le stazioni agrometeorologiche di Kneja, Kyustendil, e in alcune regioni orientali, presso le stazioni agrometeorologiche di Razgrad, Sliven, è inferiore al 65% della capacità di campo (CC).

A gennaio, condizioni più adatte per effettuare la potatura invernale nei vigneti e nei frutteti si verificheranno durante la seconda metà del mese.

Fonte: NIMH