

Previsioni agrometeorologiche per metà gennaio

Автор(и): Растителна защита
Дата: 13.01.2020 Брой: 1/2020



Il tempo relativamente secco previsto nel periodo sarà adatto per eseguire arature profonde e lavorazioni interfilari nei vigneti e nei frutteti, che distruggono gran parte degli stadi svernanti di numerosi parassiti (punteruoli, tignole, tentredini della frutta, ecc.). Le temperature diurne positive previste permetteranno l'esecuzione dei trattamenti invernali di protezione delle piante nei frutteti.

All'inizio di gennaio, in alcune località della Bulgaria occidentale (Vidin, Knezha, Dragoman, Sofia, Kyustendil) e nella Pianura Tracia (Plovdiv, Chirpan), sono state registrate temperature minime di circa meno 10-11°C. Questi valori, in condizioni senza copertura nevosa e con una persistenza più prolungata, sono pericolosi per le colture invernali seminate tardivamente che svernano negli stadi di emergenza e sviluppo fogliare iniziale.

Dopo il breve periodo di freddo, durante il periodo successivo le condizioni agrometeorologiche subiranno un cambiamento. Sono previste temperature sopra la norma fino a metà gennaio, ma i loro valori medi giornalieri rimarranno al di sotto del minimo biologico necessario per la ripresa dei processi vegetativi nelle colture cerealicole invernali, e le colture rimarranno in uno stato di dormienza.

Non sono previste precipitazioni significative durante il periodo, e il livello delle riserve di umidità del suolo per le colture cerealicole invernali negli strati di 50 e 100 cm rimarrà insolitamente basso per la stagione – in alcune regioni orientali al di sotto del 60% della capacità di campo. All'inizio dell'inverno, negli anni senza siccità autunnale, le riserve di umidità del suolo nello strato di 100 cm di solito raggiungono livelli vicini alla capacità di campo.

Il tempo relativamente secco previsto nel periodo sarà adatto per eseguire arature profonde e lavorazioni interfilari nei vigneti e nei frutteti, che distruggono gran parte degli stadi svernanti di numerosi parassiti (punteruoli, tignole, tentredini della frutta, ecc.). Le temperature diurne positive previste permetteranno l'esecuzione dei trattamenti invernali di protezione delle piante nei frutteti.

Fonte: NIMH