

Previsioni agrometeorologiche per la fine di gennaio e l'inizio di febbraio

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.02.2020 Брой: 2/2020



Nel corso del periodo, a causa delle temperature superiori alla norma, le colture autunno-vernine nelle aree di campo passeranno da una dormienza profonda a una relativa. In alcune zone della Pianura Danubiana e nelle regioni orientali, dove sono previste temperature massime fino a 14-15°C, le temperature medie giornaliere raggiungeranno e supereranno il minimo biologico necessario per la ripresa dei processi vegetativi nelle colture cerealicole invernali. Queste temperature sopra la norma influenzeranno principalmente le colture più arretrate, nelle fasi di emergenza e di 1-2 foglie. Una parte significativa del frumento ha cessato la sua vegetazione autunnale nelle fasi di terza foglia e di accestimento.

Le precipitazioni attese nel prossimo periodo non avranno significato economico e le riserve di umidità del suolo per le colture autunnali nelle aree di campo rimarranno insolitamente basse per la stagione. Alla fine della seconda decade di gennaio, in alcune regioni orientali (Razgrad, Sliven) il livello delle riserve di umidità negli strati di 50 e 100 cm era inferiore al 60% della capacità di campo.

All'inizio di febbraio, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da un tempo caldo per la stagione. Entro la metà della prima decade di febbraio, in molte parti del paese sono previste temperature massime intorno ai 18-20°C, e temperature medie giornaliere di 4-5°C superiori al minimo biologico richiesto per la vegetazione delle colture cerealicole invernali. Sotto queste alte temperature, insolite per la stagione, in gran parte delle aree di campo il fattore limitante per la ripresa dei processi vegetativi nelle colture seminate in autunno sarà il deficit di umidità negli strati superficiali del suolo, a causa delle scarse precipitazioni di gennaio, che, con poche eccezioni, sono inferiori a 10 l/m². A causa della mancanza di umidità, in alcune aree di campo si osserva un parziale ingiallimento delle colture di frumento.

Alla fine della settimana corrente, è atteso un cambiamento significativo delle condizioni agrometeorologiche. Il previsto brusco calo delle temperature ostacolerà il prematuro rigonfiamento delle gemme in alcuni alberi da frutto a fioritura precoce. Sono attese precipitazioni di pioggia e neve, nonché un miglioramento delle condizioni per lo svernamento delle colture agricole.

Nella maggior parte dei giorni del periodo, le condizioni permetteranno di effettuare la potatura nei vigneti e nei frutteti. Nelle colture frutticole, insieme alla potatura di diradamento e di raccorciamento, si esegue anche la potatura fitosanitaria – si eliminano rami e germogli mummificati, secchi e infestati da malattie. Quando si effettua la potatura fitosanitaria, i tagli devono essere effettuati a una distanza di 30-40 cm dalla zona danneggiata, e gli attrezzi devono essere disinfettati dopo ogni taglio.

Fonte: NIMH