

Condizioni meteorologiche dinamiche con frequenti precipitazioni a marzo

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.03.2020 Брой: 3/2020



Le temperature stagionali sopra la norma nella seconda metà di febbraio hanno ripreso la vegetazione di gran parte delle colture agricole svernanti.

Durante la prima decade di marzo, le condizioni agrometeorologiche saranno nuovamente determinate da temperature sopra la norma. Il clima caldo previsto all'inizio del mese, con temperature massime fino a 18-19°C, attiverà i processi vegetativi nelle colture seminate in autunno e negli alberi da frutto nelle regioni di pianura del paese. Le precipitazioni attese nel corso della decade miglioreranno le riserve di umidità del suolo nello strato di cinquanta centimetri e le condizioni per lo sviluppo delle colture cerealicole invernali e della colza invernale. In

questo periodo, una parte significativa delle coltivazioni di frumento, che hanno svernato allo stadio di terza foglia, entrerà nella fase di accestimento. Nella colza, predominerà lo stadio a rosetta.

Durante la seconda decade, le temperature previste, attorno e leggermente al di sotto delle norme climatiche, limiteranno lo sviluppo delle colture agricole. In alcune località della Bulgaria settentrionale e nelle regioni occidentali, dove non sono escluse precipitazioni sotto forma di neve, si osserverà un indebolimento e una cessazione a breve termine della vegetazione nelle colture seminate in autunno. Nelle restanti regioni del paese, i valori delle temperature medie giornaliere saranno prossimi al minimo biologico richiesto per lo sviluppo delle colture cerealicole invernali e della colza invernale.

Durante la terza decade di marzo, è previsto un miglioramento delle condizioni termiche e un'attivazione dei processi vegetativi nelle colture seminate in autunno. Alla fine del mese, nella fase di accestimento predominerà nel frumento. Nelle colture cerealicole invernali seminate nel periodo agrotecnico ottimale, si osserverà un aumento del coefficiente di accestimento.

A marzo, nelle colture frutticole si verificheranno le seguenti fasi fenologiche: rigonfiamento e schiusura delle gemme a frutto, e alla fine della terza decade, nelle specie a nocciolo (mandorlo, albicocco, pesco) nelle regioni di pianura, si osserveranno la formazione delle gemme e la fioritura. Le temperature minime previste durante il mese, fino a meno 8°C, rappresenteranno un rischio per le colture frutticole che sono avanzate nel loro sviluppo e sono entrate nelle fasi di formazione delle gemme e fioritura.

Le precipitazioni di febbraio, dopo la prolungata siccità invernale, hanno contribuito a superare il deficit idrico nelle colture cerealicole invernali negli strati superiori del suolo. Le precipitazioni previste a marzo, attorno e sopra la norma, aumenteranno le riserve di umidità del suolo nello strato di un metro.

Nella maggior parte dei giorni di marzo, il tempo dinamico previsto, con frequenti precipitazioni, ostacolerà l'attuazione di alcune attività agrotecniche stagionali. Condizioni più favorevoli per effettuare i trattamenti fitosanitari pre-fioritura nei frutteti, e per la lavorazione pre-semina delle aree destinate alle colture primaverili precoci e medio-precoci, si verificheranno all'inizio del mese e durante la maggior parte dei giorni della terza decade. A metà marzo, inizia la finestra agrotecnica (15-20.03) per la semina del girasole nella Bulgaria meridionale, e a metà della terza decade (25.03–5.04) – nella Pianura Danubiana.