

Attività di difesa delle piante difficili a metà marzo

Автор(и): Растителна защита
Дата: 19.03.2020 Брой: 3/2020



All'inizio di marzo, sulle regioni della Bulgaria occidentale e centrale sono cadute precipitazioni comprese tra 20 e 40 l/m², che hanno portato a un aumento delle riserve di umidità del suolo nello strato di 50 cm e 100 cm nelle colture agricole.

A metà marzo, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da temperature medie giornaliere attorno e sopra il minimo biologico delle colture agricole svernanti. I loro processi vegetativi procederanno a ritmi normali. Le precipitazioni previste nella prima metà del periodo, ancora una volta più significative in quantità nella Bulgaria sudoccidentale e centrale, favoriranno l'aumento delle riserve di umidità nello strato di suolo di un metro.

Durante il periodo, il frumento sarà nella fase di accestimento di massa e si osserverà un aumento del coefficiente di accestimento. Si verificherà la ramificazione nella colza. Nelle specie arboree da frutto avverranno il rigonfiamento e la schiusura delle gemme, e in alcuni fruttiferi a nocciolo (pesco, albicocco) nella Bulgaria centrale e orientale, si verificherà anche la fase di fioritura. Durante il periodo, inizia il periodo agrotecnico per la semina del girasole nella Bulgaria meridionale.

Le precipitazioni previste in molti luoghi nelle aree di campo ostacoleranno l'esecuzione di lavorazioni del suolo di qualità e l'attuazione delle attività di protezione delle piante.

Fonte NIMH