

# Aumento significativo delle temperature all'inizio di aprile

*Автор(и):* Растителна защита  
*Дата:* 07.04.2020 *Брой:* 4/2020



Dopo gli insoliti eventi meteorologici invernali alla fine di marzo e all'inizio di aprile, che hanno causato ulteriori danni alle colture frutticole avanzate nel loro sviluppo, durante il prossimo periodo di sette giorni le condizioni agrometeorologiche subiranno un cambiamento significativo.

Per i primi giorni del periodo è previsto un aumento delle temperature. Nelle aree di campo i loro valori medi giornalieri raggiungeranno e supereranno il minimo biologico richiesto per la vegetazione delle colture cerealicole invernali e della colza.

È prevista una normalizzazione delle condizioni termiche e un'attivazione dei processi vegetativi nelle colture autunno-vernine seminate e nelle colture primaverili seminate alla fine del periodo. Alla fine della prima decade di aprile, nelle coltivazioni di frumento e orzo si osserveranno le seguenti fasi: accestimento, transizione all'allungamento del fusto e fase di allungamento del fusto, principalmente nelle colture in parti della Pianura Danubiana e nelle regioni orientali del paese (stazioni agrometeorologiche: Novachene, Silistra, Tsarev Brod, Razgrad, D. Chiflik, Karnobat). Nella colza invernale si osserverà l'inizio della fase di gemmazione.

Entro la fine della prima decade di aprile, in molti luoghi delle regioni di campo, l'elevato contenuto di umidità negli strati superficiali del suolo, a seguito delle significative precipitazioni all'inizio della primavera, ostacolerà l'esecuzione delle lavorazioni pre-semina e la semina delle colture primaverili medio-precoci. Per questo motivo, sono attesi ritardi nella semina del girasole. Il termine agrotecnico per la semina del girasole nella Pianura Danubiana è fino a metà della prima decade di aprile, e fino alla fine della decade – nella Bulgaria nord-orientale, nelle zone costiere e negli alti campi della Bulgaria sud-occidentale.

Condizioni favorevoli per effettuare trattamenti fitosanitari nelle colture frutticole non colpite dalle gelate primaverili si verificheranno nella seconda metà del periodo.

*Fonte NIMH*