

Previsioni agrometeorologiche per il mese di aprile

Автор(и): Растителна защита
Дата: 20.04.2020 *Брой:* 4/2020



All'inizio di aprile, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da un tempo variabile e fresco. Le precipitazioni previste fino a metà della prima decade manterranno gli strati superficiali del terreno saturi d'acqua in molte parti del paese, ritardando le lavorazioni pre-semina e la semina del girasole. I termini agrotecnici per la semina del girasole nella Bulgaria meridionale sono scaduti alla fine di marzo. Fino a metà della prima decade di aprile è il periodo ottimale per la semina del girasole nella Pianura Danubiana, e fino alla fine della decade – nella Bulgaria nordorientale, nelle zone costiere e negli altopiani della Bulgaria sudoccidentale.

Un aumento e una normalizzazione delle temperature e un'attivazione dei processi vegetativi nelle colture invernali e nelle seminate primaverili è previsto per la fine della prima e la prima metà della seconda decade. A metà aprile, lo stadio di crescita predominante per le colture cerealicole invernali sarà la levata, e per la colza – la bottonatura. Per la colza in fase di bottonatura (dal bottone verde a quello giallo), è necessario effettuare un monitoraggio per la presenza e la densità di popolazione di uno dei parassiti più pericolosi – il meligete. Quando la popolazione del parassita supera la soglia di danno economico ($SDE > 5$ coleotteri per pianta), deve essere eseguito un tempestivo trattamento prima che la colza entri in fase di fioritura.

Durante la seconda metà del mese, lo sviluppo delle colture agricole procederà a ritmo più sostenuto, con temperature intorno e sopra la norma per il periodo. La colza sarà prevalentemente in piena fioritura. Nel frumento, si osserveranno gli stadi di levata e il passaggio dalla levata alla spigatura. Alla fine di aprile, in alcune delle colture entrate in levata più precocemente – durante la seconda decade di marzo (stazioni agrometeorologiche di Silistra, D. Chiflik) – si osserverà anche lo stadio di spigatura. In questo periodo, le colture cerealicole invernali dovrebbero essere monitorate per la comparsa e l'attività dannosa della cimice dei cereali, del crisomelide delle foglie e del tisanottero del grano.

All'inizio della terza decade, la temperatura del terreno nello strato di 10 cm nelle aree di campo avrà valori idonei per la semina del mais, e alla fine del mese – anche per le colture primaverili termofile (cotone, arachidi, fagioli, angurie e meloni, ecc.).

Le significative precipitazioni all'inizio della primavera, che in molti luoghi hanno superato i 30-35 l/m², hanno aumentato le riserve di umidità del terreno nello strato di un metro. Nella maggior parte del paese, ad eccezione di alcune località nelle regioni orientali e nell'estremo sud, sono state misurate riserve di umidità superiori al 90% della capacità di campo nelle colture cerealicole invernali. Le precipitazioni previste ad aprile, intorno e sopra la norma, forniranno l'umidità necessaria per il normale svolgimento delle fasi iniziali di vegetazione delle colture primaverili seminate e delle colture seminate in autunno che sono entrate nella fase riproduttiva del loro sviluppo.

Durante il mese, le temperature minime previste, fino a -2°C, costituiranno un'ulteriore prova per gli alberi da frutto avanzati nel loro sviluppo. Condizioni più idonee per effettuare trattamenti fitosanitari nelle colture frutticole non colpite dalle gelate primaverili si verificheranno nella seconda metà della prima, all'inizio della seconda, e a metà della terza decade.

Fonte: NIMH