

Come ottenere rese non solo più alte, ma anche di qualità superiore in girasole e mais?

Автор(и): Растителна защита
Дата: 24.04.2020 Брой: 4/2020



*Nei tempi difficili di oggi, ogni produttore agricolo affronta la sfida di come aumentare la resa e la qualità della propria produzione preservando allo stesso tempo la fertilità del suolo. La risposta è una – l'utilizzo del biostimolante dalla formulazione unica **Amalgerol Essence**, che agisce simultaneamente sul suolo, sulle radici e sulle piante.*

Girasole

Sulla base di molti anni di prove condotte in istituti bulgari e dell'esperienza dei produttori agricoli che hanno riposto la loro fiducia in **Amalgerol Essence**, osserviamo i seguenti risultati nel girasole:

- Il livello di **contenuto di olio** con la tecnologia standard è del 42–45%.
- Applicando la tecnologia standard con l'uso di **Amalgerol Essence** il contenuto di olio aumenta al 46–48%.

Il valore dei risultati ottenuti dipende anche dal potenziale intrinseco dell'ibrido.

Assistiamo sempre più alla tendenza per cui i commercianti di girasole forniscono un premio aggiuntivo per l'alto contenuto di olio, e la produzione con un contenuto di olio più elevato viene acquistata a un prezzo più alto. Abbiamo osservato per primi questo fatto tra le società di esportazione, e ora i frantoi bulgari ne stanno seguendo l'esempio.

Sul mercato esistono ibridi speciali – **ibridi di girasole alto-oleico**, per i quali è richiesto un contenuto minimo di acido oleico dell'80%. La pratica dimostra che gli ibridi alto-oleico trattati con tecnologia standard in combinazione con **Amalgerol Essence** hanno un contenuto di acido oleico dell'88–90% e vengono acquistati a un prezzo più elevato.

Per la resa del girasole dopo l'uso di **Amalgerol Essence** registriamo un aumento del **10–15%**, a seconda che le piante vengano trattate una o due volte. Applicazione:

- primo trattamento allo stadio di crescita di 2–4 paia di foglie;
- secondo trattamento all'inizio dello stadio di bottonatura prima della chiusura delle file (solitamente in combinazione con prodotti per il controllo del sorgo d'Aleppo).

La dose raccomandata è di 200 ml/da.

Mais

Amalgerol Essence garantisce anche eccellenti risultati nel **mais**, con una o due applicazioni a seconda della tecnologia agricola del produttore:

- Il primo trattamento viene effettuato insieme all'applicazione di erbicidi contro il sorgo d'Aleppo e altre graminacee. In caso di siccità primaverile, il trattamento con **Amalgerol Essence** consente al mais di far fronte allo stress e superare la siccità con danni minimi grazie agli antiossidanti contenuti nel prodotto. Se

si verifica un periodo di siccità in primavera e il mais non è stato trattato con **Amalgerol Essence**, raccomandiamo un trattamento immediato prima dell'arrotolamento delle foglie.

- È consigliabile che il secondo trattamento con **Amalgerol Essence** avvenga alla fine di giugno allo stadio di 16° foglia (inizio emissione della pannocchia) durante l'applicazione fogliare di un prodotto azotato liquido (a basso contenuto di biuret).

Attraverso il secondo trattamento, il mais tollera più efficacemente le siccità tradizionalmente attese in luglio e agosto, e le rese sono più alte del **15–20%** (anche di più in alcuni casi). La dose di applicazione è di 200 ml/da.

Raccomandiamo di effettuare il primo trattamento con **Amalgerol Essence** su girasole e mais, poiché influisce sulla formazione di un apparato radicale più potente e di una massa fogliare meglio sviluppata.

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=3ivXtDzW5S4>

Per maggiori informazioni, visita: https://www.mediplusr.com/amalgerol_essence/