

La martora può causare gravi danni ai frutti del ciliegio

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.05.2020 Брой: 5/2020



Il cetonia dorata – *Cetonia aurata* L. è diffusa in tutto il paese. Danneggia gli alberi da frutto, con una preferenza per ciliegio e pero. Si trova anche su vite, rosa e rosa canina. È stato inoltre riscontrato che causa danni a mais e cavolo. Si presenta più frequentemente sui fiori di rosa canina e rosa. Si nutre anche delle parti floreali di camomilla, coriandolo e achillea.

Negli ultimi anni la cetonia dorata è stata osservata in alcuni impianti di ciliegi e giardini privati nella regione di Kyustendil. La sua densità di popolazione è più alta nelle aree infestate da erbacce e tra i cespugli di rosa canina e i frutteti di ciliegi incolti. Su singoli alberi sono stati registrati fino a 80 – 100 esemplari.

L'insetto adulto è un coleottero relativamente grande. La lunghezza del corpo arriva fino a 2 cm. Il pronoto e le elitre sono di un verde intenso con una lucentezza metallica dorata. La parte ventrale è di colore rosso-rame. Sulle elitre sono presenti strisce trasversali bianche.

La cetonia dorata ha una generazione all'anno. I coleotteri svernano nel terreno. In primavera compaiono durante la fioritura degli alberi da frutto. I coleotteri sono attivi e volano verso mezzogiorno, quando fa più caldo. Rodono stami e pistilli dei fiori e danneggiano foglie e frutti.

Sui frutti di ciliegio infestati rodono ferite profonde e nella maggior parte dei casi li distruggono completamente. Abbiamo registrato l'80% di frutti danneggiati su un singolo albero.

Danni

Le femmine fecondate depongono le uova nel legno marcio e nel terreno ricco di legno decomposto. Le larve si sviluppano in questo ambiente in decomposizione e si impupano nello stesso anno.

La lotta chimica contro la cetonia dorata dovrebbe essere diretta contro lo stadio adulto, che causa i danni principali. Finora non sono stati testati insetticidi contro questo parassita perché non si presentava frequentemente. Il controllo è complicato anche dal fatto che i trattamenti devono essere effettuati al momento della maturazione dei frutti e devono essere rispettati i periodi di carenza.

Controllo

La cetonia dorata appartiene alla famiglia degli Scarabeidi, che include anche l'oziorrinco. Si consiglia di utilizzare insetticidi con un breve intervallo pre-raccolta, che siano autorizzati contro l'oziorrinco: Vaztak Nov 100 EC – 10 ml/da. Possono essere utilizzate anche trappole di colore azzurro chiaro o bianco con attrattivo. Per ridurre i danni causati dalla cetonia dorata, è necessaria anche una buona pratica agronomica – lavorazione regolare del terreno, concimazione, raccolta, rimozione e distruzione della vegetazione infestante, dei cespugli di rosa canina e dei residui vegetali in decomposizione, dove si sviluppano le larve del parassita.