

Piogge e aumento del rischio di grandine all'inizio di maggio

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.05.2020 Брой: 5/2020*



Nel corso del prossimo periodo di sette giorni, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da un tempo instabile e temperature medie giornaliere vicine alle norme climatiche per la prima decade di maggio. Nel periodo sono previste precipitazioni diffuse, insieme a un miglioramento delle condizioni per la vegetazione delle colture autunno-vernine e delle colture primaverili seminate. Dopo l'intensificarsi della siccità primaverile nelle regioni nordorientali, le precipitazioni attese forniranno l'opportunità di recupero per parte delle colture cerealicole invernali che si trovano in condizioni critiche. Il deficit di umidità del suolo in molte località della Bulgaria nordorientale è stato un fattore limitante per lo sviluppo del frumento e una causa di ingiallimento in parte delle colture.

Nelle regioni sudoccidentali e nella maggior parte della Pianura Tracia, dove ad aprile sono cadute precipitazioni di rilevanza economica – in alcune località oltre 50-60 l/m² (Kyustendil-67 l/m², Blagoevgrad-52 l/m², Sandanski-73 l/m², Pazardzhik-83 l/m², Plovdiv-87 l/m², Haskovo-93 l/m², Stara Zagora-50 l/m², Chirpan-67 l/m²), le condizioni delle colture cerealicole invernali sono buone.

Nel prossimo periodo, nelle aree di campo, frumento e orzo passeranno dalla fase di allungamento del fusto alla spigatura e alla fase di spigatura. Per mais e girasole, a seconda delle date di semina, si osserveranno le fasi di emergenza e formazione delle foglie.

Durante la prima settimana di maggio, non sono previste temperature minime critiche per le colture agricole, ma la probabilità di grandine rimane elevata. In caso di danni da grandine, si raccomanda di trattare le colture colpite alla prima opportunità con fungicidi a base di rame per ridurre il rischio di infezioni secondarie.

Fonte: NIMH