

Previsioni agrometeorologiche per il mese di maggio

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 17.05.2020 Брой: 5/2020*



Durante la prima decade di maggio, lo sviluppo delle colture agricole procederà a un ritmo moderato, con temperature medie giornaliere vicine alle norme climatiche. All'inizio di maggio, le precipitazioni previste saranno decisive per la sopravvivenza di parte delle colture cerealicole invernali nella Bulgaria nordorientale. Alla fine di aprile, in molte località delle regioni nordorientali, il livello delle riserve di umidità del suolo per il frumento negli strati di 50 cm e 100 cm era insolitamente basso per la stagione, al di sotto del 55-60% della capacità di campo, a causa delle precipitazioni inferiori alla norma nella prima metà della primavera. Per questo motivo, parte delle coltivazioni di frumento si trova in condizioni critiche. Danni e ingiallimento della massa fogliare (fino al 50-60%),

come conseguenza del deficit di umidità del suolo, sono stati registrati nel frumento presso le stazioni agrometeorologiche di Silistra e Tsarev Brod.

Durante la prima decade di maggio, nelle regioni di pianura si osserverà la fase di spigatura nel frumento e nell'orzo.

Alla fine della prima e durante la seconda decade, è previsto un aumento delle temperature e un'accelerazione della vegetazione nelle colture cerealicole invernali e nelle colture primaverili seminate. In questo periodo, nel frumento avverranno la fioritura, la fecondazione e la formazione della granella.

Durante la terza decade, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da un tempo instabile e fresco per il periodo. Le significative precipitazioni previste avranno un'importanza eccezionalmente grande per le colture cerealicole invernali, in cui sarà in corso l'ingrossamento della granella. Alla fine di maggio, parte delle coltivazioni di orzo e frumento in alcune località delle regioni meridionali entrerà nella fase di maturazione latte.

Durante il mese, avverrà la formazione delle foglie nel mais e nel girasole. Alla fine della terza decade, nel girasole seminato entro i termini agrotecnici, si osserverà la formazione dell'infiorescenza.

Nelle colture frutticole, avverrà la formazione e l'ingrossamento dell'allegagione. Nella vite si osserverà la separazione dell'infiorescenza e, alla fine del mese, anche la fase di fioritura.

Le frequenti precipitazioni di maggio creeranno condizioni favorevoli per lo sviluppo di numerose malattie fungine: peronospora sulla vite e sulle colture orticole; ticchiolatura sulle pomacee, monilia precoce e corineo sulle drupacee; ruggini (gialla, bruna) e fusariosi della spiga nelle colture cerealicole invernali.

Condizioni più idonee per effettuare i trattamenti fitosanitari si verificheranno nella seconda metà della prima e nella maggior parte dei giorni della seconda decade.

A maggio, non sono previste temperature minime critiche per le colture agricole, ma la probabilità di grandine rimane elevata. In caso di danni da grandine, è consigliabile che le colture colpite vengano trattate alla prima occasione con fungicidi a base di rame per una più rapida cicatrizzazione delle ferite e per ridurre il rischio di infezioni secondarie.

Fonte: NIMH