

Previsioni agrometeorologiche per il mese di giugno

Автор(и): Растителна защита
Дата: 10.06.2020 Брой: 6/2020



Durante la maggior parte dei giorni della prima e della seconda decade di giugno, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da tempo instabile. All'inizio del mese, lo sviluppo delle colture agricole procederà a un ritmo più lento, a causa di temperature inferiori alla norma. Fino alla metà della prima decade, sono previste precipitazioni in molte parti del paese, che miglioreranno le riserve di umidità del suolo nello strato di 50 cm e le condizioni per la vegetazione delle colture primaverili. Le piogge alla fine di maggio e quelle previste per l'inizio di giugno si sono rivelate troppo tardive per le colture autunno-vernine in molte località della Bulgaria orientale, dove le fasi riproduttive del loro sviluppo si sono verificate in condizioni di crescente deficit idrico del suolo. In gran parte delle regioni orientali, si prevedono rese fortemente ridotte e, in alcuni luoghi, le colture ingiallite prematuramente, con spighe poco piene, non verranno raccolte.

Dopo il tempo più fresco del solito per la stagione nella seconda metà della prima decade, è previsto un miglioramento delle condizioni termiche. Durante la decade, nelle colture cerealicole invernali negli altopiani, avverrà la fase di riempimento della granella. Nelle zone di pianura, il frumento sarà nella fase di maturazione lattea e, entro la fine della decade, in alcuni luoghi, si osserverà anche l'inizio della fase di maturazione cerosa. *Durante il periodo inter-fase dal riempimento della granella alla maturazione lattea, gravi danni al frumento sono causati dalle larve della Cimice dei cereali (Eurygaster maura). In questo periodo, le colture di frumento devono essere monitorate per la presenza del parassita e, se la sua densità supera la soglia economica di danno, è necessario un trattamento tempestivo.*

All'inizio della seconda decade, nelle zone di pianura l'orzo sarà prevalentemente nella fase di maturazione cerosa e la colza sarà nella fase di maturazione.

Durante la seconda metà di giugno, lo sviluppo delle colture agricole procederà a un ritmo più rapido. Alla fine della seconda e all'inizio della terza decade, il frumento sarà prevalentemente nella fase di maturazione.

Entro la fine di giugno, alcune delle colture primaverili entreranno nelle fasi riproduttive del loro sviluppo: nel girasole si osserverà l'inizio della fioritura e negli ibridi di mais più precoci – la formazione della pannocchia e la fioritura della spiga maschile.

Il previsto tempo instabile di giugno, con frequenti precipitazioni, creerà condizioni favorevoli per lo sviluppo di una serie di malattie fungine: peronospora nei vigneti e nelle colture orticole, ticchiolatura negli alberi da frutto, ecc. Durante il mese, la probabilità di temporali con grandine rimarrà elevata. Dopo una grandinata, le colture frutticole e orticole colpite devono essere trattate con fungicidi a base di rame alla prima occasione utile.

Fonte: NIMH