

Periodo con condizioni favorevoli all'aumento del potenziale infettivo delle malattie fungine nelle colture agricole

Автор(и): Растителна защита

Дата: 01.07.2020 Брой: 7/2020



Alla fine di giugno e all'inizio di luglio, le condizioni agrometeorologiche subiranno un cambiamento significativo. Durante gli ultimi giorni di giugno, non sono previste precipitazioni nelle aree di campo, il che fornirà l'opportunità di eseguire alcuni trattamenti fitosanitari urgenti. Il tempo instabile persistente nel periodo passato ha creato le condizioni per un aumento del fondo infettivo di numerose malattie fungine: ticchiolatura, corineo e monilia tardiva negli alberi da frutto; peronospora nei vigneti e nelle colture orticole, ecc. In molte parti del paese, le precipitazioni significative hanno impedito la raccolta del raccolto di grano maturo. In alcuni dei frumenti inondati, è iniziato l'annerimento delle spighe, il che comporta il rischio di un deterioramento della qualità del grano.

Nel periodo seguente, lo sviluppo delle colture primaverili procederà a un ritmo accelerato, con temperature intorno e sopra le norme climatiche per l'inizio dell'estate e con riserve di umidità da buone a molto buone negli strati superficiali del suolo. Nella maggior parte del paese, ad eccezione delle regioni nord-occidentali estreme (stazione agrometeorologica di Buzovets) e sud-occidentali (stazione agrometeorologica di Sandanski), le riserve di umidità del suolo nello strato di 50 cm sono a livelli superiori al 75-80% della capacità di campo. Durante il periodo, il girasole sarà nelle fasi di formazione dell'infiorescenza e fioritura, principalmente nelle colture delle regioni meridionali. Negli ibridi di mais precoci, si osserveranno le fasi di emissione della pannocchia e fioritura della pannocchia, mentre negli ibridi più tardivi – formazione delle foglie. Alla fine di giugno e all'inizio di luglio, i campi di mais dovrebbero essere ispezionati per la presenza di uno dei parassiti più importanti – la piralide del mais, e quando la sua densità supera la soglia di danno economico (10 ovature per 100 piante), è necessario un trattamento (contro le giovani larve prima che penetrino nei fusti).

All'inizio di luglio, sono di nuovo previste precipitazioni e le condizioni per svolgere l'attività più importante – la raccolta del frumento – peggioreranno.

Fonte: NIMH