

Previsioni agrometeorologiche per luglio

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.07.2020 *Брой:* 7/2020



Nella prima metà della prima decade di luglio, lo sviluppo delle colture agricole procederà in condizioni termiche superiori alla norma. All'inizio del mese, nella maggior parte del paese, ad eccezione delle regioni nord-occidentali estreme (stazione agrometeorologica di Buzovets) e sud-occidentali (stazione agrometeorologica di Sandanski), la vegetazione delle colture primaverili avverrà in condizioni di buone riserve di umidità del suolo negli strati di 50 cm e 100 cm (oltre il 75-80% della capacità di campo) – come risultato delle significative precipitazioni di giugno, superiori alla norma, che in alcune località hanno superato i 90-100 l/m² (Montana – 96 l/m², Veliko Tarnovo – 133 l/m², Ruse – 90 l/m², Silistra – 136 l/m², Dobrich – 105 l/m², Varna – 103 l/m², Kazanlak – 104 l/m², Haskovo – 92 l/m², Kardzhali – 173 l/m², Stara Zagora – 115 l/m²).

Durante la prima decade, a seconda della precocità degli ibridi di mais, si verificheranno varie fasi: formazione delle foglie, emissione della pannocchia, fioritura della pannocchia e emissione delle setole. Nel girasole, nelle aree di pianura prevarrà la fase di fioritura, mentre negli appezzamenti nei campi più alti – la formazione dell'infiorescenza. Nelle leguminose da granella (fagioli, soia), si osserverà la formazione dei baccelli.

Durante la seconda e l'inizio della terza decade, lo sviluppo delle colture agricole procederà a un ritmo moderato, con temperature intorno e leggermente al di sotto della norma per il periodo. Le frequenti precipitazioni previste in questo periodo avranno un effetto benefico sulle colture primaverili che si trovano nella fase riproduttiva del loro sviluppo, quando la domanda di acqua aumenta bruscamente (nel mais, nel periodo dall'emissione della pannocchia alla maturazione lattea, il consumo idrico giornaliero raggiunge 6-7 m³/decare). All'inizio della terza decade di luglio, parte degli ibridi di mais precoci nelle aree di pianura entrerà nella fase di maturazione lattea. Nel girasole avverranno la formazione e il riempimento dei semi. Alla fine del mese, negli appezzamenti seminati nei tempi agrotecnici, in alcune località della Pianura Danubiana e nelle regioni meridionali, si osserverà l'inizio della fase di maturazione.

Durante l'ultima settimana di luglio, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da un tempo relativamente secco, caldo e afoso, che renderà necessario l'applicazione di un adeguato regime di irrigazione per gli ibridi di mais tardivi e le colture orticole da produzione tardiva in campo. Le condizioni meteorologiche in questo periodo limiteranno lo sviluppo di una serie di malattie fungine, ad eccezione degli oidii sulle colture orticole e sugli alberi da frutto, e dell'oidio (*oidium*) sulla vite.

A luglio, non si deve sottovalutare il trattamento fitosanitario nelle colture frutticole contro la seconda generazione di carpocapsa, afidi e acari. Condizioni più adatte per effettuare i trattamenti fitosanitari si verificheranno nella maggior parte dei giorni della prima e della terza decade, durante le ore più fresche della giornata.

Durante i periodi più caldi di luglio, con temperature massime fino a 38-39°C, aumenterà il rischio di incendi durante la raccolta dei cereali.

Fonte: NIMH