

Protezione delle piante in pesco e albicocco a fine giugno e inizio luglio

Автор(и): проф. Мария Боровинова

Дата: 07.07.2020 Брой: 7/2020



Nel **pesco**, i trattamenti continuano contro l'oidio, la corineosi, la monilia, l'Anarsia, la tignola orientale e gli afidi.

Per l'oidio, si utilizza uno dei seguenti fungicidi: Difkor 250 EC – 20 ml/da, Embrelia – 150 ml/da, Indar 5 EW – 150 ml/da, Karamat 2.5 EW – 300 ml/da, Kozavet DF – 150 g/da, Kumulus DF – 750 g/da, Luna Experience – 50 ml/da, Miklofil – 32-60 ml/da, Password 25 WG – 50 g/da, Ritual – 32-60 ml/da, Sercadis – 15 ml/da, Signum WG – 45 g/da, Systhane 20 EW – 15-36 ml/da, Systhane EcoZome EW – 65-200 ml/da, Score 250 EC – 20-30 ml/da, Solfo 80 WG – 750 g/da, Sulgran – 500 g/da, Sulphur WG – 600 g/da, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da, Topaz 100 EC – 50 ml/da, Flosul SC – 500 ml/da, Fontelis SC – 120 ml/da, Heliosulfur C – 125-500 ml/da, Hercules 120 SC – 15-25 ml/da. Tra i fungicidi elencati, anche Indar 5 EW – 150 ml/da, Karamat 2.5 EW – 300

ml/da, Luna Experience – 50 ml/da, Password 25 WG – 50 g/da, Signum – 45 g/da, Systhane 20 EW – 15-36 ml/da, Systhane EcoZome EW – 65-200 ml/da, Score 250 EC – 20-30 ml/da, Fontelis SC – 120 ml/da sono efficaci contro la monilia e vengono utilizzati per il controllo simultaneo di entrambe le malattie.

Per la tignola orientale e l'Anarsia, si utilizza uno dei seguenti insetticidi: Avant 150 EC – 33.3 ml/da, Affirm Opti – 200-225 g/da, Voliam Targo 063 SC – 75 ml/da, Delegate 250 WG – 30 g/da, Imidan 50 WG – 150 g/da, Coragen 20 SC – 16-30 ml/da, Lamadex Extra – 70 g/da, Meteor – 90 ml/da, Sumi Alpha 5 EC – 0.02%.

Ad alta densità di afidi, il trattamento viene effettuato con: Abanto – 60 ml/da, Ascot WG – 40-80 g/da, Deka EC/Desha EC/Dena EC/Poleci/Decision – 30-50 ml/da, Decis 100 EC – 8.75-12.25 ml/da, Estrela WG/Lamsha WG/Adalam WG/Indulam WG – 40-80 g/da, Calypso 480 SC – 20 ml/da, Lamadex Extra – 40-60 g/da, Movento 100 SC – 0.075-0.1%, Mospilan 20 SG – 25 g/da, Natur Breaker – 75 ml/da, Proteus O-TEC – 0.05% - 0.06%, Teppeki – 14 g/da.

Nell'**albicocco**, i trattamenti vengono effettuati contro la monilia, la gnomonia, la corineosi, l'Anarsia e la tignola orientale. *Per la monilia, si utilizza uno dei seguenti fungicidi:* Delan 700 WG – 0.05%, Difkor 250 EC – 20 ml/da, Embrelia – 150 ml/da, Indar 5 EW – 150 ml/da, Karamat 2.5 EW – 300 ml/da, Luna Experience – 50 ml/da, Password 25 WG – 50 g/da, Signum WG – 30 g/da, Systhane 20 EW – 12.5-30 ml/da, Chorus 50 WG – 40-50 g/da. Tra i fungicidi indicati, anche Delan 700 WG – 0.05%, Karamat 2.5 EW – 300 ml/da e Signum WG – 30 g/da sono efficaci contro la gnomonia. *Per l'Anarsia e la tignola orientale, si utilizza uno degli insetticidi indicati per il pesco.*

Affinché i trattamenti contro le malattie e i parassiti nelle colture frutticole siano efficaci, devono essere eseguiti in modo tempestivo e di alta qualità. Inoltre, è molto importante determinare la necessità di eseguire un determinato trattamento, il che è legato a un monitoraggio specifico per determinare la densità dei parassiti; quando si superano le soglie economiche di danno, deve essere effettuato un trattamento.