

Previsioni agrometeorologiche per la fine di luglio

Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.07.2020 *Брой:* 7/2020



Alla fine di luglio, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da un clima caldo con temperature attorno e sopra la norma. Nella prima metà del periodo, sono nuovamente previste precipitazioni nella Bulgaria occidentale e in alcune parti della Bulgaria centrale, che miglioreranno il contenuto di umidità degli strati superficiali del suolo. Nel periodo passato in queste regioni, sono state registrate precipitazioni agronomicamente significative tra i 20 e i 40 l/m², ma di carattere locale. Nella parte restante del paese, l'assenza di precipitazioni ha portato a un crescente deficit idrico del suolo.

Durante il periodo, si verificheranno le fenofasi della fioritura e del riempimento del seme nel girasole. In alcuni ibridi più precoci, seminati entro i termini agrotecnici, si verificherà la fase di maturazione (stazioni

agrometeorologicheski ot Sliven, Lyubimets). Nel mais si osserveranno fasi diverse: negli ibridi tardivi saranno in corso la fioritura e l'antesi, negli ibridi medio-precoci si osserveranno l'emissione della barba e l'ingiallimento della barba, e negli ibridi di mais più precoci in alcune parti della Pianura Danubiana (stazione agrometeorologica di Pavlikeni) si osserverà la maturazione lattea. Nella vite si osserverà la fase di invaiatura e ammorbidimento degli acini.

Durante il periodo, le condizioni saranno adatte per lo svolgimento delle attività agrotecniche stagionali legate alla lavorazione del suolo nelle aree liberate dalle colture cerealicole invernali: erpicatura delle stoppie, con l'obiettivo di interrompere i capillari del suolo e preservare l'umidità disponibile nel terreno, aratura e lavorazione pre-semina, e trattamenti con erbicidi totali in caso di forte infestazione di erbe infestanti nelle aree dopo il raccolto. Nei frutteti di mele e nei vigneti continua la spruzzatura di fungicidi per prevenire l'infezione e lo sviluppo dell'oidio. Le attività di protezione delle piante dovrebbero essere effettuate a una temperatura dell'aria non superiore a 25°C.

Fonte NIMH