

All'inizio di settembre ci sono condizioni adatte per la raccolta delle colture seminate in primavera e per la raccolta del raccolto di frutta e verdura.

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.09.2020 Брой: 9/2020*



Alla fine di agosto, le condizioni agrometeorologiche sono state caratterizzate da temperature superiori alla norma e dalla mancanza di precipitazioni, il che ha avuto un impatto negativo sulle fasi finali di sviluppo delle colture primaverili tardive e ha ostacolato la corretta esecuzione della lavorazione del terreno pre-semina.

Nel periodo successivo, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da temperature vicine alle norme climatiche. All'inizio del periodo, sono previste localmente precipitazioni economicamente significative

nella Bulgaria nordorientale. Durante il periodo, il girasole si troverà prevalentemente nella fase di maturazione tecnica. Negli ibridi di mais tardivo, si verificheranno le fasi di maturazione lattea e cerosa. È in corso il periodo ottimale per la semina delle aree a colza invernale. In molte regioni, la siccità del suolo ostacolerà le attività agrotecniche e la semina del colza invernale. Ciò renderà necessaria una semina più tardiva, con il possibile periodo di semina che si estenderà fino alla fine del mese. Nei frutteti di melo, viene monitorata l'attività dannosa della seconda generazione di carpocapsa e, se necessario, vengono effettuati trattamenti contro il parassita. Viene eseguita la disinfezione delle sementi di frumento e orzo destinate alla semina autunnale contro le malattie trasmesse da seme (carbone volgare, carbone nudo, septoriosi e malattie da fusarium).

Le condizioni saranno adatte per la raccolta delle colture primaverili che hanno raggiunto la maturazione tecnica, per lo svolgimento di attività di protezione delle piante nelle colture perenni e per la raccolta della produzione ortofrutticola.

Fonte: NIMH