

# Previsioni agrometeorologiche per settembre

*Автор(и):* Растителна защита  
*Дата:* 21.09.2020 *Брой:* 9/2020



Anche a settembre, le condizioni agrometeorologiche nella Bulgaria occidentale differiranno significativamente da quelle delle regioni orientali del paese.

Nella Bulgaria orientale saranno determinate da temperature superiori alla norma e precipitazioni inferiori alla norma. In molte località delle regioni orientali, a causa della prolungata siccità estiva, le colture primaverili hanno completato la loro vegetazione prematuramente. In queste aree, la raccolta del girasole e degli ibridi di mais precoci è iniziata prima delle date consuete, con rese ben al di sotto della media nazionale.

A settembre, nella maggior parte delle regioni occidentali, le fasi finali di sviluppo delle colture agricole tardive avverranno con temperature superiori alla norma, con precipitazioni vicine alle norme climatiche e con buone

riserve di umidità del suolo di fine estate negli strati di 50 e 100 cm (oltre il 70% della capacità di campo – Nikolaevo, Kyustendil, Sandanski) – come risultato delle precipitazioni superiori alla norma di agosto (Vidin – 67 l/m<sup>2</sup>, Lom – 80 l/m<sup>2</sup>, Sofia – 84 l/m<sup>2</sup>, Kyustendil – 98 l/m<sup>2</sup>, Blagoevgrad – 152 l/m<sup>2</sup>, Sandanski – 107 l/m<sup>2</sup>).

Durante la prima decade di settembre, sono nuovamente previste precipitazioni di significato agronomico per la metà occidentale del paese. Avranno un effetto benefico sulle seconde colture e sugli ibridi di mais tardivi, che si troveranno nello stadio di maturazione lattea. In questo periodo, nelle aree di campo gli ibridi medio-tardivi entreranno nello stadio di maturazione cerosa. Entro la metà del mese, parte degli ibridi tardivi completerà il loro sviluppo. Durante la seconda decade, il riso sarà negli stadi di maturazione cerosa e piena. Nella terza decade, lo stadio di maturazione si verificherà per il cotone, le arachidi, le varietà di alberi da frutto autunnali e le varietà di uva più tardive. Per il mese, i valori minimi di temperatura previsti sono superiori alle soglie critiche per le colture orticole, il che è un presupposto per ottenere una produzione orticola aggiuntiva dalla coltivazione tardiva in campo.

Nella maggior parte dei giorni della seconda e terza decade, è previsto un tempo relativamente asciutto e le condizioni saranno adatte per liberare le aree dalle colture primaverili.

Anche a settembre, in gran parte delle regioni orientali, la mancanza di umidità negli strati superiori del suolo ostacolerà l'esecuzione di qualità dell'aratura profonda e della lavorazione pre-semina delle aree destinate alla semina con colza invernale e colture cerealicole invernali. Il periodo ottimale per la semina del colza è fino alla fine della seconda decade del mese. Nella terza decade, iniziano nei campi ad altitudini più elevate i termini agrotecnici di semina per l'orzo e il frumento.

*Fonte: NIMH*