

Controllare le colture regolarmente per la presenza di arvicole comuni durante ottobre e novembre

Автор(и): Растителна защита

Дата: 12.10.2020 Брой: 10/2020



In ottobre e novembre, le colture autunnali devono essere ispezionate e, quando la densità di popolazione del parassita arvicola comune supera la soglia di danno economico (2 colonie attive per decaro), sono necessarie misure di controllo.

Arvicola comune (*Microtus agrestis*) – è diffusa in tutto il paese. Provoca danni alle colture cerealicole, all'erba medica, alla colza, ai frutteti, ecc. Vive in colonie in lunghe gallerie con un numero variabile di aperture sulla superficie del suolo. Le colonie abitabili sono identificate dai cumuli di terra sparsi, dall'apertura ben

formata e dalle foglie verdi inserite al suo interno. In inverni caldi e secchi, la capacità riproduttiva dell'arvicola è molto alta. Si riproduce tutto l'anno e la prole di una singola coppia può raggiungere fino a 2400 individui. Si nutre delle parti verdi della pianta. I danni si osservano dall'emergenza della coltura fino al raccolto. In caso di grave infestazione, la coltura si dirada. Dopo il raccolto, si consiglia un'aratura profonda per distruggere le colonie ed eliminare qualsiasi vegetazione infestante potenzialmente emergente che serve da cibo per l'arvicola. Durante le ispezioni in campo, viene determinata la densità di popolazione dell'arvicola e, quando sono presenti 2 colonie attive per decaro, vengono posizionate esche avvelenate nelle aperture (quelle abitabili) e vengono calpestare con il piede per proteggere gli uccelli e la selvaggina utile. Il trattamento viene effettuato con rodenticidi autorizzati a questo scopo (granuli di Phostoxin) – esche avvelenate che vengono posizionate agli ingressi delle colonie.