

Miglioramento delle condizioni per lo svolgimento delle attività agrotecniche stagionali a metà ottobre

Автор(и): Растителна защита

Дата: 21.10.2020 Брой: 10/2020



A metà ottobre, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da tempo instabile e temperature vicine alla norma per la seconda decade del mese. Le precipitazioni significative del periodo passato hanno superato i 40-50 l/m² in molte parti del paese (N. selo - 66 l/m², Lovech - 61 l/m², Pleven - 73 l/m², V. Tarnovo - 61 l/m², Svishtov - 51 l/m², Kazanlak - 73 l/m², Kardzhali - 60 l/m², Stara Zagora - 54 l/m², Chirpan - 60 l/m², Karnobat - 63 l/m²), il che ha portato a un netto miglioramento delle riserve di umidità del suolo negli strati superficiali e delle condizioni per le fasi iniziali della vegetazione delle colture autunnali seminate. All'inizio del periodo, sono attese ulteriori precipitazioni e un aumento delle riserve di umidità del suolo nello strato di 50 cm. In molte

località della Bulgaria occidentale e centrale raggiungeranno livelli fino al 75% e oltre della capacità di campo. Un cambiamento positivo nei livelli di umidità del suolo è atteso anche nelle regioni nord-orientali del paese, che sono state le più colpite dalla prolungata siccità.

A metà del periodo, è prevista una sostanziale diminuzione delle temperature e, nei campi di bacino – valori minimi critici per le colture orticole sensibili al gelo. Lo sviluppo delle colture autunnali seminate alla fine della seconda e all'inizio della terza decade procederà in condizioni termiche inferiori alla norma. Nel frumento e nell'orzo seminati durante la prima decade di ottobre, prevarrà lo stadio di emergenza. Nelle colture cerealicole invernali seminate in precedenza, alla fine di settembre e all'inizio di ottobre, si osserverà la formazione delle foglie (1–2 foglie).

Un miglioramento delle condizioni per lo svolgimento delle attività agrotecniche stagionali, la più importante delle quali è la semina del frumento, è atteso alla fine del periodo. La prossima settimana coincide con il termine agrotecnico per la semina delle colture cerealicole invernali nella Bulgaria meridionale.

Durante la terza decade di ottobre, nelle colture di frumento seminate in precedenza, dovrebbe essere monitorata la densità di popolazione di determinati parassiti: arvicola comune, crisomela del frumento, mosche dei cereali, ecc., che causano gravi danni alle colture cerealicole invernali nelle fasi iniziali della loro vegetazione.

Fonte: NIMH