

'Pioggia e condizioni adatte per piantare alberi da frutto a novembre'

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 11.11.2020 Брой: 11/2020*



Dopo la prolungata siccità, le precipitazioni superiori alla norma di ottobre, che in alcune località della Bulgaria settentrionale hanno superato i 70-80 l/m² (N. selo - 72 l/m², Montana - 71 l/m², Knezha - 80 l/m², Pleven - 94 l/m², Lovech - 79 l/m², Dobrich - 75 l/m²), hanno portato a un significativo aumento delle riserve di umidità negli strati superficiali del suolo e a un miglioramento delle condizioni per l'avanzamento delle fasi iniziali della vegetazione delle colture autunnali seminate. Alla fine di ottobre, presso le stazioni agrometeorologiche di Silistra, Knezha, Sofia, Kyustendil, Novachene, Nikolaevo, Pavlikeni, Borima, Kazanlak, Pazardzhik, Plovdiv, nello strato di 50 cm per le colture cerealicole invernali i livelli hanno raggiunto e superato il 75-80% della capacità di campo.

A novembre, le precipitazioni previste, attorno e sopra la norma mensile, aumenteranno le riserve di umidità autunnale nello strato di suolo di 50 e 100 cm.

Durante la prima metà di novembre, lo sviluppo delle colture cerealicole invernali e della colza invernale procederà a un ritmo moderato, con temperature vicine alle norme climatiche. In questo periodo, nel frumento, a seconda delle date di semina, si osserveranno fasi diverse – emergenza, terza foglia e accestimento nelle colture seminate precocemente, alla fine di settembre e all'inizio di ottobre.

Alla fine della seconda decade è previsto un raffreddamento e un sostanziale cambiamento delle condizioni agrometeorologiche. Nei campi più alti, dove non sono escluse precipitazioni sotto forma di neve, si osserverà una cessazione dei processi vegetativi nelle colture autunnali.

Durante la terza decade di novembre, lo sviluppo delle colture nella maggior parte delle regioni di campo procederà a un ritmo rallentato, con temperature vicine al minimo biologico richiesto per la vegetazione delle colture cerealicole invernali. Condizioni per processi vegetativi più attivi in frumento, orzo e colza invernale si creeranno nelle regioni meridionali e sudorientali del paese. Alla fine di novembre, predomineranno le colture di frumento e orzo nella fase della terza foglia.

Quest'anno la siccità ha impedito la semina tempestiva della colza invernale. Per questo motivo, entro la fine di novembre solo una parte delle colture, principalmente quelle seminate all'inizio dell'autunno, mostrerà l'inizio della fase di formazione della rosetta (5-6 foglie).

A novembre, le temperature minime previste, fino a meno 7°C, sono superiori ai livelli critici per le colture autunnali che si trovano in una fase iniziale del loro sviluppo.

Condizioni più adatte per la piantumazione degli alberi da frutto si verificheranno durante la prima metà del mese.

Fonte: NIMH