

Previsioni agrometeorologiche per la fine di novembre e l'inizio di dicembre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.11.2020 *Брой:* 11/2020



Alla fine di novembre, il paese si è svegliato sotto una coltre di neve. Nella notte scorsa è caduta la prima neve della stagione nella Bulgaria occidentale. Le temperature sono scese sotto lo zero, per cui le precipitazioni a Sofia, Razgrad, Pernik e Kyustendil si sono trasformate in neve. Si prevede che lo strato nevoso raggiunga fino a 5 cm, tranne che nella Pianura Danubiana, dove il suo spessore sarà compreso tra 10 e 15 cm, in alcuni punti fino a 20 cm.

Alla fine di novembre e all'inizio di dicembre, le condizioni agrometeorologiche saranno sempre più dinamiche. All'inizio del periodo saranno determinate da un clima mite per la stagione, con temperature medie giornaliere

nella maggior parte delle aree coltivate intorno o superiori al minimo biologico richiesto per la vegetazione delle colture cerealicole invernali e della colza invernale.

Durante questo periodo, è previsto un calo significativo delle temperature e un cambiamento delle condizioni agrometeorologiche. Il raffreddamento previsto porterà a un rallentamento, e nei campi più alti e nel Pre-Balcani, dove sono previste precipitazioni anche nevose, a una cessazione dei processi vegetativi nelle colture seminate in autunno. Eccezioni si verificheranno in alcuni luoghi delle regioni sudorientali e lungo la costa del Mar Nero, dove si osserverà una vegetazione debolmente espressa delle colture cerealicole invernali.

All'inizio di dicembre, nelle colture di grano seminate nel periodo agrotecnico, in ottobre, si osserverà la fase di accestimento, nella quale le colture cerealicole invernali svernano con successo. La fase della terza foglia prevarrà nelle colture seminate all'inizio di novembre. Le colture seminate tardivamente, a metà novembre, non sono ben affrancate e si trovano nelle fasi di emergenza e formazione fogliare iniziale. Nella colza, la fase a rosetta, la fase adatta per lo svernamento, sarà osservata nelle colture seminate all'inizio dell'autunno.

Durante il prossimo periodo, sono attese precipitazioni e un miglioramento delle riserve di umidità del suolo negli strati superiori del terreno. A causa delle precipitazioni di novembre inferiori alla norma, le riserve di umidità del suolo negli strati di 50 e 100 cm nei campi di grano nella maggior parte del paese sono insolitamente basse per la stagione – in alcuni luoghi nelle regioni orientali e nell'estremo sud inferiori al 60% della capacità di campo (stazioni agrometeorologiche Sandanski, Haskovo, Sliven, Razgrad).

All'inizio del prossimo periodo, le condizioni saranno adatte per la piantumazione di alberi da frutto e per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari autunnali nelle colture frutticole.

Per proteggere le colture frutticole dal freddo invernale, per distruggere licheni e muschi, e per allontanare la cimice marmorata marrone e la falena leopardo, è necessario trattare i tronchi e i rami spessi degli alberi con una calce al 20% alla quale viene aggiunta una piccola quantità di argilla.

Fonte: NIMH