

Previsioni agrometeorologiche per febbraio

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.02.2021 *Брой:* 2/2021



Durante la prima decade di febbraio, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da temperature superiori alla norma e in molte località delle aree di pianura i loro valori medi giornalieri raggiungeranno il minimo biologico necessario per la ripresa dei processi vegetativi nelle colture cerealicole invernali.

Alla fine della prima e all'inizio della seconda decade, è previsto un calo delle temperature, che impedirà una vegetazione prematura nelle colture seminate in autunno e in alcune specie di drupacee a fioritura precoce nelle regioni di pianura del paese. Durante la seconda decade, le temperature medie giornaliere previste saranno vicine alle norme climatiche e manterranno le colture agricole invernali in dormienza.

Durante la terza decade, le condizioni agrometeorologiche saranno nuovamente determinate da temperature superiori alla norma, che disturberanno la dormienza relativa delle colture seminate in autunno e la dormienza forzata di alcune colture frutticole a fioritura precoce. Alla fine di febbraio, nelle colture cerealicole invernali in alcune località della Bulgaria meridionale e lungo la costa del Mar Nero, si creeranno condizioni per una vegetazione ritardata, ma non è previsto un cambiamento significativo nello status fenologico delle colture. Nel frumento, si osserveranno gli stadi di crescita della terza foglia e dell'accestimento. Nelle regioni estreme meridionali e sudorientali, in alcune specie di drupacee a fioritura precoce (mandorlo, pesco, ciliegio), si verificheranno il rigonfiamento delle gemme e in alcuni luoghi l'inizio della schiusura delle gemme.

A febbraio, i valori previsti delle temperature minime, fino a meno 12-13°C, in condizioni senza copertura nevosa e con una durata più prolungata, rappresenteranno un rischio per le colture cerealicole invernali seminate tardivamente che hanno interrotto la vegetazione allo stadio di 2-3 foglie, e per le colture di colza che non sono riuscite a formare una rosetta durante la loro vegetazione autunnale.

Le precipitazioni attese durante il mese, intorno e sopra la norma, aumenteranno le riserve di umidità nello strato di suolo di due metri. Come risultato delle precipitazioni superiori alla norma di gennaio, che in molte località del paese hanno superato i 140-150 l/m² (Vratsa -146 l/m², Shumen -147 l/m², Varna -154 l/m², Dragoman -158 l/m², Blagoevgrad -145 l/m², Sandanski -151 l/m², Haskovo -146 l/m², Kardzhali -176 l/m², Elhovo -163 l/m², Burgas -185 l/m²), le riserve di umidità del suolo nello strato di un metro nelle colture cerealicole invernali hanno raggiunto livelli vicini alla capacità di campo (CC).

Durante la prima e la seconda decade di febbraio, l'elevato contenuto di umidità negli strati superficiali del suolo limiterà le possibilità di svolgere alcune attività agrotecniche – la concimazione di copertura delle colture seminate in autunno con fertilizzanti minerali azotati, la lavorazione pre-semina delle aree destinate alla semina con colture primaverili precoci (pisello, veccia, avena, orzo primaverile). Condizioni più adatte per la potatura nei vigneti e nei frutteti, e per i trattamenti fitosanitari invernali nei frutteti, saranno disponibili nella maggior parte dei giorni della prima e della terza decade di febbraio.