

Previsioni agrometeorologiche per marzo

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.03.2021 Брой: 3/2021



Dopo il breve periodo di freddo all'inizio di marzo, durante la maggior parte dei giorni della prima metà del mese le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da temperature vicine alle norme climatiche e al minimo biologico richiesto per lo sviluppo delle colture cerealicole invernali. In questo periodo, nelle regioni meridionali del paese si creeranno le condizioni per l'inizio della vegetazione nelle colture seminate in autunno.

Per la seconda metà della seconda decade è previsto un sostanziale aumento delle temperature e un'attivazione dei processi vegetativi nelle colture cerealicole invernali e nelle piantagioni perenni.

Durante la terza decade lo sviluppo delle colture agricole procederà a ritmo accelerato, in condizioni termiche superiori alla norma. Alla fine del mese, il frumento e l'orzo si troveranno prevalentemente nella fase di

accestimento, con un passaggio all'allungamento del fusto nelle colture di alcune regioni meridionali e sudorientali del paese. Nella colza invernale, che ha svernato in stadio di rosetta, si verificherà su larga scala la ramificazione.

A marzo si osserveranno vari stadi fenologici nelle colture frutticole – dal rigonfiamento delle gemme e dal loro schiudimento fino agli stadi di grappolo verde e fioritura nelle specie drupacee a fioritura precoce – mandorlo, albicocco, pesco, nelle regioni meridionali e in alcune zone della Pianura Danubiana, dove le temperature superiori alla norma di febbraio hanno provocato uno sviluppo prematuro nei frutteti.

A marzo, le temperature minime previste, fino a meno 7°C, rappresenteranno un rischio per le colture frutticole più avanzate negli stadi di formazione delle gemme e fioritura.

Le precipitazioni previste a marzo, vicine alla norma mensile, aumenteranno le riserve di umidità del suolo anche nello strato di due metri. Alla fine di febbraio, nella maggior parte delle regioni coltivate le riserve di umidità del suolo nello strato di un metro sotto le colture cerealicole invernali erano a livelli vicini alla capacità di campo. Eccezioni sono state osservate in alcune zone della Pianura Danubiana – stazioni agrometeorologiche: Bazovets, Novachene, Pavlikeni, e nelle regioni sudorientali – stazioni agrometeorologiche: Sliven, Karnobat, Dolni Chiflik, dove le riserve di umidità del suolo nello strato di un metro sotto il frumento erano inferiori al 90% della capacità di campo.

A marzo, condizioni adatte per lo svolgimento delle attività agrotecniche stagionali – lavorazioni pre-semina e semina delle colture primaverili precoci e medio-precoci (veccia, avena, orzo primaverile, pisello); trattamenti preventivi pre-fioritura nei frutteti contro una serie di malattie – moniliosi (marrume bruno precoce), corineo, bolla del pesco, ticchiolatura, ecc., saranno disponibili durante la maggior parte dei giorni della prima e durante la seconda metà della terza decade.

Le frequenti precipitazioni previste durante la seconda e la prima metà della terza decade di marzo manterranno un alto contenuto di umidità negli strati superficiali del suolo e, per questo motivo, in alcune zone delle regioni meridionali verranno superati i termini agrotecnici per la semina del girasole. Il periodo ottimale per la semina del girasole nella Bulgaria meridionale si verifica tra il 15 e il 20 marzo, mentre nella Pianura Danubiana inizia a metà della terza decade del mese (25.03–5.04).

