

Temperature critiche per le specie di drupacee a fioritura precoce

Автор(и): Растителна защита
Дата: 16.03.2021 *Брой:* 3/2021



Gli eventi meteorologici della fine dell'inverno, tra la fine della prima e l'inizio della seconda decade di marzo, hanno interrotto i processi vegetativi delle colture autunno-vernine in gran parte delle regioni campione del paese e hanno messo a dura prova le colture frutticole più avanzate nel loro sviluppo. In alcune località della Pianura Danubiana e nelle regioni meridionali (Plovdiv, Stara Zagora, Chirpan) sono state registrate temperature minime fino a $-6/-7^{\circ}\text{C}$, critiche per alcuni alberi da frutto che hanno già iniziato le fasi di germogliamento e fioritura – mandorlo, albicocco e pesco.

Nella seconda metà di marzo sono previste temperature minime negative e un rischio aumentato di danni per le specie di drupacee a fioritura precoce.

Fino alla fine della seconda decade le condizioni agrometeorologiche saranno altamente dinamiche. Dopo il breve riscaldamento e lo scioglimento delle nevi a metà marzo, per la seconda parte del periodo sono previste temperature sotto la norma, che freneranno lo sviluppo delle colture agricole. Eccezioni sono attese nelle regioni più a sud, dove le temperature medie giornaliere raggiungeranno e supereranno il minimo biologico richiesto per la vegetazione delle colture cerealicole invernali. Alla fine dell'inverno, le coltivazioni di frumento si troveranno prevalentemente nella fase di accestimento.

Nel prossimo periodo sono attese precipitazioni significative e un aumento delle riserve di umidità del suolo nello strato di 100 cm. Nella maggior parte delle regioni campione, per le colture cerealicole invernali, queste raggiungeranno livelli superiori al 90% della capacità di campo (CC).

Nel periodo le condizioni saranno inadatte per effettuare le lavorazioni stagionali del terreno e per la semina delle colture primaverili precoci e medio-precoci. È alta la probabilità che vengano persi i termini agrotecnici per la semina del girasole nella Bulgaria meridionale, che inizia a metà marzo.

Fonte: NIMH