

Previsioni agrometeorologiche per il mese di aprile

Автор(и): Растителна защита
Дата: 18.04.2021 *Брой:* 4/2021



Durante la prima decade di aprile, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da temperature superiori alle norme climatiche. Le previste condizioni termiche sopra la norma accelereranno i processi vegetativi delle colture cerealicole invernali, e gran parte delle colture in campo entrerà massicciamente nella fase di allungamento del fusto. Nella colza si osserveranno la ramificazione e l'inizio della fase di bottonatura.

Nella maggior parte dei giorni della decade non sono attese precipitazioni significative e le condizioni in molte parti del paese permetteranno

l'esecuzione delle lavorazioni pre-semina e della semina del girasole. La prima decade di aprile è il termine agrotecnico per la semina del girasole nella Bulgaria settentrionale.

Alla fine della prima e all'inizio della seconda decade è previsto un calo delle temperature, una stabilizzazione del tempo e un sostanziale cambiamento delle condizioni agrometeorologiche. In questo periodo sono attese precipitazioni significative e un aumento delle riserve di umidità del suolo, incluso nello strato dei due metri. All'inizio della primavera, nella maggior parte delle aree coltivate, le riserve di umidità del suolo per il frumento nello strato di un metro avevano raggiunto livelli superiori al 90% della capacità di campo. Eccezioni si verificano in alcune regioni orientali – stazioni agrarie di Razgrad, Dolni Chiflik, Sliven – dove il livello delle riserve idriche è inferiore, sotto l'80% della capacità di campo.

Alla fine della prima e all'inizio della seconda decade di aprile, è prevista una stabilizzazione a breve termine del tempo e condizioni adatte per effettuare alcuni trattamenti fitosanitari urgenti nei frutteti: allo stadio del bottone fiorale nelle pomacee (melo, pero) contro la ticchiolatura; trattamenti post-fioritura in alcune drupacee a fioritura precoce contro il marciume dei fiori (monilia precoce) e la corineo; nel ciliegio e amareno contro la più pericolosa malattia fungina – la cilindrosporiosi (cosiddetta ruggine bianca), e altre.

Durante la seconda decade di aprile, lo sviluppo delle colture agricole procederà a ritmo più lento, in condizioni termiche inferiori alla norma. Alla fine della decade è prevista una maggiore probabilità di formazione di gelate, da tenere in considerazione durante l'indurimento delle piantine di ortaggi e tabacco. Le minime previste, in alcuni luoghi fino a meno 2–3°C, saranno critiche per i fiori e i giovani allegati degli alberi da frutto se persisteranno a lungo.

All'inizio della terza decade è previsto un riscaldamento e nelle aree coltivate le temperature del suolo nello strato di dieci centimetri raggiungeranno valori adatti per la semina del mais.

Durante la terza decade, la vegetazione delle colture agricole procederà a ritmo moderato con temperature vicine alle norme climatiche. In questo

periodo, nelle colture cerealicole invernali si passerà dall'allungamento del fusto alla levata e alla fase di spigatura. Nella colza predominerà la fase di fioritura.

In aprile, le frequenti precipitazioni creeranno le condizioni per un aumento del potenziale infettivo di numerose malattie fungine nei frutteti – marciume dei fiori (monilia precoce), ticchiolatura, corineo, bolla del pesco e altre. Condizioni più adatte per effettuare trattamenti fitosanitari nelle colture frutticole si verificheranno nella maggior parte dei giorni della prima e nella prima metà della terza decade.

Fonte: NIMH