

Previsioni agrometeorologiche per il mese di maggio

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.05.2021 *Брой:* 5/2021



Quest'anno, il clima fresco durante la prima metà della primavera ha ritardato lo sviluppo delle colture agricole. Per la maggior parte dei giorni di maggio, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da un tempo instabile.

Le temperature previste sopra la norma all'inizio di maggio accelereranno i processi vegetativi nelle colture autunno-vernine e in quelle primaverili seminate. Durante la prima decade, nel frumento si verificheranno varie fasi: allungamento del fusto, passaggio alla spigatura e spigatura. Nell'orzo delle regioni meridionali (Stazione Agrometeorologica di Sandanski), si osserverà la fase di fioritura. Nella colza avverranno la fioritura, la fecondazione e la formazione dei baccelli.

Dopo il clima caldo d'inizio mese, nella seconda metà della prima decade è prevista una normalizzazione delle condizioni termiche. Le precipitazioni attese in questo periodo ritarderanno l'esecuzione di alcune attività agrotecniche stagionali – completamento della semina del mais da granella, lavorazioni pre-semina e semina delle colture primaverili termofile tardive (fagioli, cotone, arachidi, ecc.).

Durante la seconda e la terza decade, lo sviluppo delle colture agricole procederà a un ritmo moderato, con temperature medie giornaliere vicine alle norme climatiche. *Le precipitazioni attese nella seconda metà di maggio manterranno un livello molto buono delle riserve idriche negli strati del suolo di 50 cm e 100 cm, superiore all'85% della capacità di campo (CC). Ciò avrà un effetto benefico sulle colture cerealicole invernali, nelle quali saranno in corso la formazione e il riempimento della granella. Alla fine di maggio, in parte delle colture di frumento e orzo delle regioni meridionali, si osserverà l'inizio della fase di maturazione latte.*

Durante il mese, nel mais e nel girasole si verificherà la formazione delle foglie. Alla fine di maggio, nel girasole seminato nei tempi agrotecnici, si osserverà la formazione dell'infiorescenza.

Nelle colture frutticole, si verificherà la formazione e l'ingrossamento dell'allegagione. Nella vite si osserverà l'emergenza delle infiorescenze, e alla fine del mese – l'inizio della fioritura – queste fasi sono critiche per l'infezione da peronospora.

Le frequenti precipitazioni di maggio creeranno condizioni favorevoli allo sviluppo di numerose malattie fungine: ruggini (bruna, gialla) e septoriosi nel frumento; peronospora nelle colture orticole e nella vite; ticchiolatura, corineo e monilia negli alberi da frutto, ecc. Durante il mese, condizioni più adatte per effettuare i trattamenti fitosanitari si verificheranno all'inizio della prima, a metà della seconda e all'inizio della terza decade.

A maggio, non sono previste temperature minime critiche per le colture agricole, ma la probabilità di grandine rimane elevata. In caso di danni da grandine, si raccomanda di trattare le colture colpite alla prima opportunità con fungicidi a base di rame per una più rapida cicatrizzazione delle ferite e per ridurre il rischio di infezioni secondarie.

Fonte: NIMH