

Метео instabile e maggiore probabilità di grandine alla fine di maggio e all'inizio di giugno

Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.05.2021 Брой: 5/2021



Nella maggior parte dei giorni di fine maggio e inizio giugno, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da tempo instabile e temperature medie giornaliere inferiori alle norme climatiche per questo periodo.

In molte parti del paese sono previste precipitazioni di significato agronomico. Nelle regioni più orientali, dove le riserve di umidità del suolo nello strato di 50 cm nella seconda metà di maggio erano le più basse, in alcuni casi inferiori al 65% della capacità di campo, come nelle stazioni agrometeorologiche di Sliven e Karnobat, è atteso un miglioramento delle riserve idriche e delle condizioni per lo sviluppo delle colture agricole. Le precipitazioni nel prossimo periodo saranno di fondamentale importanza per le colture cerealicole invernali, nelle quali avverrà

la fase di riempimento della granella, e nelle regioni meridionali – anche per la fase di maturazione lattea.

Durante il periodo dal riempimento della granella alla maturazione lattea, gravi danni al frumento sono causati dalle larve della cimice dei cereali, il che rende necessario il monitoraggio delle colture per la presenza del parassita e, quando la densità di popolazione supera la soglia economica di danno, che è di 2 larve/m², dovrebbe essere eseguito un trattamento insetticida alla prima opportunità.

Durante il periodo, nel mais e nel girasole avverrà la formazione delle foglie. All'inizio di giugno solo una piccola parte delle colture di girasole, principalmente quelle seminate nei tempi agrotecnici, entrerà nella fase di formazione dell'infiorescenza.

Le frequenti precipitazioni durante il periodo ostacoleranno l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari e creeranno condizioni favorevoli per lo sviluppo di una serie di malattie fungine: peronospora sulle colture orticole e sulla vite, monilia sui frutti delle varietà precoci di ciliegio, muffa grigia sulle fragole, ticchiolatura sugli alberi da frutto, ecc.

Per fine maggio e inizio giugno è nuovamente prevista un'elevata probabilità di grandine, che causa gravi danni alle colture agricole e perdite al raccolto frutticolo dei frutteti attualmente in maturazione.

Ricordiamo che ieri un devastante nubifragio con grandine ha distrutto la produzione agricola in diversi villaggi dei comuni di Sopot e Karlovo. Secondo stime preliminari, quasi il 70% della produzione è stato distrutto dal disastro. I danni alle piantagioni di rose, che sono nella fase di fruttificazione, sono estesi.

Fonte: NIMH