

Previsioni agrometeorologiche per giugno

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.06.2021 *Брой:* 6/2021



Durante la prima decade di giugno, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da tempo instabile. All'inizio del mese sono previste precipitazioni significative e un miglioramento delle riserve di umidità del suolo nello strato di 50 e 100 cm. Nella maggior parte del paese, le riserve di umidità del suolo per le colture primaverili raggiungeranno livelli fino a, e nella Pianura Danubiana – addirittura superiori all'80-85% della capacità di campo. L'umidità del suolo rimarrà inferiore in alcune regioni orientali e meridionali, dove le precipitazioni di maggio sono state inferiori, in alcuni casi al di sotto del 50-60% delle norme mensili – G. Delchev, Sliven, St. Zagora, Varna, Karnobat, Burgas, Ahtopol.

All'inizio di giugno, lo sviluppo delle colture agricole procederà a un ritmo più lento, in condizioni meteorologiche fresche per la stagione. Durante la prima decade, si verificheranno la fase di riempimento della granella e la

maturazione lattea nel frumento. Alla fine della decade, nell'orzo in alcune località delle regioni meridionali, si osserverà anche la maturazione cerosa – Sandanski. I rovesci limiteranno le possibilità di eseguire trattamenti fitosanitari contro la peronospora nella vite e nelle colture orticole, la ticchiolatura e la monilia negli alberi da frutto, e contro la cimice dei cereali nelle colture cerealicole invernali. Nella seconda metà del periodo, rimane alta la probabilità di grandinate e precipitazioni locali, che comportano un rischio di danni alle colture agricole. Il rischio di allettamento nelle colture di frumento e orzo è elevato.

Durante la seconda decade, è previsto un miglioramento e una normalizzazione delle condizioni termiche. In questa decade, l'orzo completerà il suo sviluppo. Nella colza, si verificherà la fase di maturazione.

Durante la terza decade, lo sviluppo delle colture agricole procederà a temperature vicine alle norme climatiche. In questo periodo, nel frumento nelle regioni di pianura, si osserverà la maturazione cerosa.

Alla fine di giugno, parte delle colture primaverili entrerà nelle fasi riproduttive del loro sviluppo. Negli ibridi precoci di mais, si osserverà la fase di emissione della pannocchia, e nel girasole seminato entro i termini agrotecnici – l'inizio della fioritura.

Nella maggior parte dei giorni del mese, l'elevata umidità atmosferica manterrà condizioni favorevoli per lo sviluppo di numerose malattie fungine: ticchiolatura, corineo e oidio negli alberi da frutto; peronosspore nelle colture orticole e nella vite, ecc. Nella vite, il periodo inter-fase dalla fioritura delle infiorescenze alla formazione dell'allegagione di dimensione di un pisello è critico per l'infezione da peronospora e oidio. Condizioni più adatte per effettuare gli estremamente importanti trattamenti fitosanitari si verificheranno nella prima metà della seconda e durante la terza decade di giugno.

Per tutto il mese, la probabilità di grandinate rimarrà elevata. In caso di danni da grandine, è consigliabile che le colture frutticole e orticole colpite vengano trattate con fungicidi a base di rame alla prima opportunità.

Fonte: NIMH