

Alla fine di giugno – alte temperature e precipitazioni locali

Автор(и): Растителна защита
Дата: 29.06.2021 *Брой:* 6/2021



Alla fine di giugno, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da un clima caldo e, in alcune zone, caldo. Lo sviluppo delle colture agricole nella maggior parte delle aree di campo procederà in presenza di buone e ottime riserve di umidità negli strati del suolo di 50 e 100 cm (oltre l'80-85% della capacità di campo) a seguito delle significative precipitazioni delle ultime due settimane, che in alcune zone della Bulgaria centrale e orientale hanno raggiunto e superato il doppio delle medie di giugno (Veliko Tarnovo – 118 l/m², Ruse – 115 l/m², Razgrad – 108 l/m², Silistra – 116 l/m², Dobrich – 111 l/m², Karnobat – 96 l/m²). Eccezioni si verificheranno in alcune delle regioni più occidentali e meridionali, dove sono state registrate precipitazioni inferiori alla norma e le riserve di umidità del suolo all'inizio dell'estate sono insoddisfacenti per le colture primaverili nello strato di 50 cm –

inferiori al 65% della capacità di campo (stazioni agrometeorologiche: Bazovets, Kyustendil, Sandanski, Haskovo, Sliven).

Durante il periodo, il girasole sarà nella fase di formazione dell'infiorescenza. All'inizio di luglio, nelle colture seminate nei tempi agrotecnici, principalmente nelle regioni meridionali, si osserverà anche l'inizio della fase di fioritura.

Nel mais, procederà la formazione delle foglie. Negli ibridi più precoci, si osserveranno le fasi di emissione della pannocchia e fioritura della pannocchia. Alla fine di giugno e all'inizio di luglio, le colture di mais dovrebbero essere ispezionate per la presenza di uno dei parassiti più importanti – la piralide del mais, e quando la densità del parassita supera la soglia economica di danno, è imperativo un trattamento tempestivo.

Le elevate temperature previste durante l'ultima settimana di giugno limiteranno lo sviluppo di una serie di malattie fungine, ad eccezione degli oidi.

Durante il prossimo periodo, il grano completerà il suo sviluppo anche nei campi più alti.

Durante il periodo, sono nuovamente previste precipitazioni locali, con una maggiore probabilità nella Bulgaria orientale, dove l'avvio della campagna di raccolta sarà ulteriormente ostacolato.

Fonte: NIMH