


Alla fine di settembre e all'inizio di ottobre, le condizioni saranno favorevoli per lo sviluppo di agenti patogeni che causano marciume nella coltura non raccolta.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.09.2022 *Брой:* 9/2022



A settembre, in alcune località delle regioni meridionali (Haskovo, Pazardzhik, Chirpan, Karnobat, Plovdiv, Sandanski, Sliven, Burgas), si sono verificate precipitazioni economicamente significative, comprese tra 15 e 20 l/m², che hanno fornito l'umidità necessaria per l'emergenza della colza invernale seminata nei tempi agrotecnici.

Un miglioramento delle condizioni agrometeorologiche è previsto per la fine del mese. Nel periodo, gli ibridi di mais tardivo completeranno il loro sviluppo e raggiungeranno la piena maturazione. Nelle varietà tardive di alberi da frutto e nei vigneti, i processi di maturazione procederanno a temperature intorno alle norme climatiche.

Nel periodo non sono attese precipitazioni significative e le condizioni permetteranno il completamento della raccolta delle colture primaverili tardive, l'esecuzione delle lavorazioni pre-semina sulle aree destinate alla semina di frumento e orzo, e l'applicazione di fertilizzanti minerali. Nel periodo, iniziano i termini agrotecnici per la semina delle colture cerealicole invernali negli altopiani e nel Pre-Balcane. Entro la fine di settembre, le condizioni permetteranno di recuperare i ritardi nella semina della colza invernale. Il periodo è adatto per la semina autunnale degli spinaci e per l'impianto di nuove fragolaie.

All'inizio del periodo, in località isolate delle pianure, non si può escludere la possibilità di formazione di gelate, che richiede il tempestivo raccolto dei prodotti sensibili ai danni da gelo.

Durante la prima settimana di ottobre, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da tempo instabile, e nella seconda metà del periodo – anche da temperature inferiori alla norma. Le precipitazioni previste nella prima settimana di ottobre ritarderanno lo sgombero delle aree dalle colture tardive in filare. Il tempo umido e fresco a metà della prima decade sarà un presupposto per lo sviluppo di patogeni che causano marciumi – muffa grigia sulla coltura non raccolta delle varietà tardive di uva da vino, e marciume bruno tardivo sui frutti delle varietà autunno-invernali di alberi da frutto.

Le precipitazioni verificatesi alla fine di settembre nelle regioni nordoccidentali, in parte di quelle nordorientali e nella piana di Sofia, nell'intervallo di 20–30 l/m² (N. selo, Vidin, Lom, Oryahovo, Sofia, V. Tarnovo, Dobrich), hanno aumentato le riserve di umidità negli strati superficiali del suolo. Nel periodo successivo, nella Bulgaria occidentale e nelle regioni centrali, è di nuovo prevista la probabilità di precipitazioni locali intense, che ostacoleranno l'esecuzione delle lavorazioni pre-semina sulle aree designate per la semina con colture autunnali. Sono attesi gravi ritardi nella semina della colza invernale. Le avverse condizioni agrometeorologiche alla fine dell'estate e all'inizio dell'autunno, la siccità e le successive precipitazioni intense, sono la ragione per cui in molte località delle regioni pianeggianti sono stati persi i termini agrotecnici di settembre per la semina della colza – una coltura che richiede un'agronomia precisa. All'inizio di ottobre, iniziano i termini agrotecnici per la semina del frumento nella Bulgaria settentrionale.

Fonte: NIMH