

La terza decade di ottobre – un fattore limitante per lo sviluppo delle colture autunnali sarà la mancanza di umidità negli strati superiori del suolo

Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.10.2022 *Брой:* 10/2022



Durante la prima metà della terza decade di ottobre, le condizioni agrometeorologiche continueranno ad essere determinate dal tempo secco e da temperature superiori alle norme climatiche.

Nelle colture di frumento e orzo seminate all'inizio del mese, si svolgeranno le fasi di germinazione, emergenza (stazioni agrometeorologiche di Novachene e Pavlikeni) e inizio di formazione delle foglie, e nella colza invernale – formazione delle foglie. In molte regioni del paese, il fattore limitante per lo sviluppo delle colture

autunnali sarà la mancanza di umidità negli strati superiori del suolo. Nella seconda metà del periodo, inizieranno i termini agrotecnici ottimali per la semina delle colture cerealicole invernali lungo la costa del Mar Nero.

Il deficit delle riserve di umidità del suolo nello strato arabile ostacolerà la corretta esecuzione dell'aratura profonda dei campi di stoppia, della lavorazione pre-semine del terreno e della semina di frumento e orzo.

Il tempo sarà adatto per il monitoraggio delle colture cerealicole invernali per la comparsa e l'attività dannosa di determinati parassiti – arvicola comune, crisomela dei cereali, mosche dei cereali e afidi. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle aree in cui viene applicata la coltivazione in monocoltura.

Le condizioni saranno favorevoli per lo svolgimento di attività fitosanitarie nelle colture permanenti – rimozione di rami secchi e frutti mummificati, raschiatura della vecchia corteccia screpolata e trattamento delle specie di pomacee colpite dalla ticchialatura con una soluzione di urea al 5% per limitare l'infezione.

Fonte: NIMH