

Alla fine di febbraio e all'inizio di marzo – un periodo adatto per la semina delle carote e dei bulbilli di cipolla.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 28.02.2023 Брой: 2/2023



Nella maggior parte dei giorni del periodo tra fine febbraio e inizio marzo, le condizioni agrometeorologiche continueranno a essere determinate da temperature superiori alla norma, che manterranno attivi i processi vegetativi nelle colture cerealicole invernali.

Nel frumento e nell'orzo, si osserveranno gli stadi di crescita della terza foglia e dell'accestimento. Nelle specie drupacee, lo stadio predominante sarà il rigonfiamento massivo delle gemme.

Verso la fine del periodo, è previsto un calo delle temperature e i loro valori medi giornalieri saranno prossimi al minimo biologico richiesto per la vegetazione delle colture cerealicole invernali.

Condizioni più favorevoli per la concimazione di copertura delle colture autunno-vernine con fertilizzanti minerali azotati, per l'esecuzione delle lavorazioni stagionali del terreno e per le potature nei frutteti e nei vigneti si verificheranno alla fine di febbraio.

Le precipitazioni previste tra fine febbraio e inizio marzo rimanderanno i trattamenti fitosanitari contro la bolla del pesco, la monilia precoce e la corineo nelle drupacee. Il periodo sarà adatto per la piantagione di bulbilli di cipolla e per la semina di spinaci e carote.

Fonte: NIMH