

Previsioni agrometeorologiche per marzo

Автор(и): Растителна защита
Дата: 14.03.2023 Брой: 3/2023



Le anomalie climatiche nella seconda metà di febbraio, con temperature massime insolitamente elevate per la stagione, superiori ai 21-22°C in molte aree di pianura (Knezha - 24°C, Lovech - 23°C, Plevan - 23°C, Plovdiv - 23°C, Chirpan - 23°C), hanno portato all'attivazione dei processi vegetativi nelle colture autunno-vernine e a uno sviluppo prematuro degli alberi da frutto.

Durante la prima decade di marzo, solo in alcune località della Bulgaria meridionale – Plovdiv, Pazardzhik, Sandanski, Kardzhali e Haskovo, si sono registrate precipitazioni economicamente significative, comprese tra 20-30 l/m², che hanno portato a un miglioramento delle riserve di umidità del suolo nelle colture autunno-vernine.

Nelle regioni centrali e orientali, le temperature sono state superiori alle norme climatiche e al minimo biologico richiesto per la vegetazione delle colture cerealicole invernali.

Nella maggior parte dei giorni della seconda decade, nelle regioni di pianura del paese, sono previste temperature vicine a quelle consuete per il periodo, nonché condizioni per una vegetazione ritardata nelle colture cerealicole invernali.

Un aumento delle temperature e l'attivazione dei processi vegetativi nelle colture autunno-vernine e nelle piantagioni perenni sono attesi nella prima metà della terza decade. Alla fine di marzo, lo stadio dell'accestimento predominerà in grano e orzo.

Durante il mese, le colture frutticole attraverseranno varie fasi - dal rigonfiamento e schiusura delle gemme fruttifere al grappolo verde, fioritura e allegagione nelle specie drupacee a fioritura precoce (mandorlo, albicocco, pesco).

A marzo sono previste temperature minime nell'intervallo di meno 5-10°C - valori critici per i fiori e i giovani frutticini degli alberi da frutto.

Le precipitazioni attese durante il mese, intorno e sopra la norma, aumenteranno le riserve di umidità del suolo nello strato di 100 cm. A causa delle precipitazioni inferiori alla norma di febbraio, il livello delle riserve di umidità del suolo negli strati di 50 e 100 cm nelle colture cerealicole invernali nelle regioni più meridionali e sudorientali era insolitamente basso per la stagione - in alcuni luoghi inferiore al 55% della capacità di campo (stazioni agrometeorologiche di Sliven, Chirpan).

A marzo, le previsioni di tempo dinamico, con frequenti precipitazioni, ostacoleranno l'attuazione delle attività agrotecniche stagionali. Condizioni più favorevoli per effettuare i trattamenti fitosanitari pre-fioritura negli alberi da frutto si verificheranno nella seconda metà della prima decade. Durante il mese, l'elevato contenuto di umidità negli strati superficiali del suolo limiterà l'attuazione delle lavorazioni pre-semina sulle aree destinate alla semina con colture primaverili precoci e medio-precoci. Per questo motivo, c'è la probabilità di perdere le date ottimali di semina del girasole nelle regioni meridionali.

A metà marzo inizia il periodo agrotecnico (15-20.03) per la semina del girasole nella Bulgaria meridionale, e a metà della terza decade (25.03–5.04) – nella Pianura Danubiana.

Dove e quando nelle diverse regioni del paese ci saranno condizioni per lo svolgimento delle attività di protezione delle piante, vedi [QUI](#)

Fonte NIMH