

Condizioni agrometeorologiche instabili e dinamiche alla fine di marzo

Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.03.2023 *Брой:* 3/2023



Alla fine di marzo, le condizioni agrometeorologiche saranno caratterizzate da una maggiore dinamicità. Nella prima metà del periodo sono previste temperature superiori alla norma e un'attivazione dei processi vegetativi nelle colture autunno-vernine e nelle piantagioni perenni. Nel frumento, la fase di accestimento si verificherà su larga scala. In alcune località della Pianura Danubiana e nelle regioni meridionali, si inizierà a osservare anche l'inizio della fase di allungamento del fusto nelle colture cerealicole invernali (stazioni agrometeorologiche: Novachene, Silistra, Haskovo).

Alla fine del mese, le condizioni agrometeorologiche subiranno un cambiamento sostanziale. Durante gli ultimi giorni di marzo, saranno determinate da temperature inferiori alle norme climatiche, vicine al minimo biologico

necessario per la vegetazione delle colture autunno-vernine e delle colture primaverili seminate. Nelle regioni nord-orientali e negli altopiani, è prevista una probabilità di precipitazioni, anche nevose, e un rischio di danni per le specie di drupacee che sono entrate nella fase di fioritura.

Le precipitazioni attese durante l'ultima settimana di marzo miglioreranno le riserve di umidità del suolo nello strato di 50 cm. Alla fine della seconda decade di marzo, in alcune parti delle regioni meridionali e orientali, il livello delle riserve di umidità del suolo nelle colture cerealicole invernali, negli strati di 50 e 100 cm, era basso per l'inizio del periodo vegetativo primaverile, in alcuni casi inferiore al 65% della capacità di campo (CC). Riserve relativamente buone, superiori all'85% della CC, sono state registrate nelle colture autunno-vernine nelle regioni nord-occidentali del paese (stazioni agrometeorologiche: Bazovets, Nikolaevo, Novachene, Borima).

Durante la maggior parte dei giorni del prossimo periodo, le previsioni di tempo instabile con frequenti precipitazioni ostacoleranno l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari nei frutteti, le lavorazioni del terreno pre-semina e la semina delle colture primaverili medio-precoci.

A metà della terza decade di marzo (25.03–05.04), inizia il periodo agrotecnico per la semina del girasole nella Pianura Danubiana.

Fonte: NIMH